

grupos na periphéria do feixe; e uma medulla, composta de cellulas parenchymatosas amyíferas.

Ensaio.—A salsaparrilha não deve deixar mais de 10 por cento de cinza pela calcinação.

Emprego official.—*Especies sudorificas.* *Extracto de salsaparrilha.* *Extracto fluido de salsaparrilha.* *Pó de salsaparrilha.*

SALVIA

Salva.

Salvia officinalis Linné; *Labiatae*.

Parte usada: folha.

Caracterização.—A folha de salvia é peciolada; seu limbo, que mede de 6 a 10 cm. de comprimento por 3 a 5 cm. de largura, é de forma variavel: é oval-oblongo ou lancolado, obtuso ou agudo, attenuado n'uma base arredondada, levemente cordiforme ou auriculada; acinzentado; tomentoso, finamente crenulado nas margens, muito rugoso na parte superior e largamente reticulado na inferior.

Esta folha tem cheiro aromatico, balsamico e sabôr amaro-aromatico e um pouco adstringente.

Estrutura microscopica.—Ambas as faces da folha têm estomas e pêlos tectores e glandulosos; os estomas offerecem a disposição commum ás *Labiatae*; os pêlos tectores são finos, de diametro quasi igual, em geral bi-cellulares, uniseriados, frequentemente flagelliformes; os pêlos glandulosos são pequenos, unicellulares, supportados por um pedicelo mais ou menos longo, uni- ou pluri-cellular; ás vezes, entretanto, são muito maiores, octocellulares e sesséis.

O mesophyllo é heterogeneo asymetrico, formado na parte superior de duas camadas de cellulas palhádicas e na inferior de um parenchyma lacunoso. A nervura mediana é biconvexa. O systema libero-lenhoso, disposto em forma de arco, é recoberto inferiormente por um liber e um pericyclo molles.

Emprego official.—*Especies aromaticas.*

SANDALO CITRINO

Santalum album Linné; *Santalaceae*.

Parte usada: lenho.

Caracterização.—Este lenho apresenta-se geralmente no commercio em achas cylindricas de 1 a 1.5 m. de comprimento e 15 a 16 cm. de diametro, muito pesadas, de superficie externa irregular, de côr amarella clara; sua secção transversal de côr variavel do amarello ao pardo-avermelhado claro, apresenta varias zonas concentricas, alternadamente claras e escuras, de diametro quasi igual, com numerosos póros, atravessadas por grande numero de estrias radiaes muito proximas umas das outras.

O sandalo citrino possúe cheiro caracteristico, muito aromatico, persistente e sabôr peculiar, fortemente aromatico.