

## EXTRACTO FLUIDO DE TASNEIRINHA

*Extractum senecionis fluidum.*

TASNEIRINHA, EM PÓ (III) . . . . .	1000 g.
ALCOOL . . . . .	Q. S.
AGUA . . . . .	Q. S.
PARA OBTER . . . . .	1000 cm. <sup>3</sup>

Prepare este extracto fluido pelo processo A (veja pag. 385), empregando como líquido extractor uma mistura de *dois* volumes de álcool com *um* volume de água.

## EXTRACTO FLUIDO DE TAYUYÁ

*Extractum tayuya fluidum.*

TAYUYÁ, EM PÓ (IV) . . . . .	1000 g.
ALCOOL . . . . .	Q. S.
AGUA . . . . .	Q. S.
PARA OBTER . . . . .	1000 cm. <sup>3</sup>

Prepare este extracto fluido pelo processo A (veja pag. 385), empregando como líquido extractor uma mistura de *dois* volumes de álcool com *um* volume de água.

**Emprego officinal.**—*Extracto fluido de caroba composto. Xarope de tayuya.*

## EXTRACTO FLUIDO DE TIMBÓ BOTICARIO

*Extractum lonchocarpi fluidum.*

TIMBÓ BOTICARIO, EM PÓ (IV) . . . . .	1000 g.
GLYCERINA . . . . .	100 cm. <sup>3</sup>
ALCOOL . . . . .	Q. S.
AGUA . . . . .	Q. S.
PARA OBTER . . . . .	1000 cm. <sup>3</sup>

Prepare este extracto fluido pelo processo B (veja pag. 385), empregando uma mistura de *cem* cm.<sup>3</sup> de glicerina, *seiscientos e cincuenta* cm.<sup>3</sup> de álcool e *duzentos e cincuenta* cm.<sup>3</sup> de água como líquido extractor I e uma mistura de *dois* volumes de álcool com *um* volume de água como líquido extractor II.

**Doses maximas:** de una vez 0.15 cm.<sup>3</sup>; em 24 horas 0.50 cm.<sup>3</sup>  
**TOXICO.**