

Prepare este extracto fluido pelo processo A (veja pag. 385), empregando o alcool como liquido extractor.

Caracterizaçãõ.—Liquido pardo-esverdeado, de sabôr nauscoso, fracamente amargo e de cheiro narcotico.

Emprego officinal.—*Extracto de canhamo da India.*

Dóses máximas: de uma vez 0.10 cm.³; em 24 horas 0.30 cm.³

TOXICO.

EXTRACTO FLUIDO DE CANNELA CRAVO

Extractum dicypelii caryophyllati fluidum.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| CANNELA CRAVO, EM PÓ (V) | 1000 g. |
| GLYCERINA | Q. S. |
| ALCOOL | Q. S. |
| AGUA | Q. S. |
| PARA OBTER | 1000 cm. ³ |

Prepare este extracto fluido pelo processo C (veja pag. 386), empregando como liquido extractor uma mistura de seis volumes de alcool com tres volumes de agua e um volume de glicerina.

EXTRACTO FLUIDO DE CANNELA DO CEYLÃO

Extractum cinnamomi ceylanici fluidum.

| | |
|--|-----------------------|
| CANNELA DO CEYLÃO, EM PÓ (V) | 1000 g. |
| GLYCERINA | Q. S. |
| ALCOOL | Q. S. |
| AGUA | Q. S. |
| PARA OBTET | 1000 cm. ³ |

Prepare este extracto fluido pelo processo C (veja pag. 386), empregando como liquido extractor uma mistura de seis volumes de alcool com tres volumes de agua e um volume de glicerina.

Emprego officinal.—*Extracto fluido de quina composto. Xarope de cannela.*

EXTRACTO FLUIDO DE CANNELA PRETA

Extractum nectandræ puberulæ fluidum.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| CANNELA PRETA, EM PÓ (V) | 1000 g. |
| GLYCERINA | 100 cm. ³ |
| ALCOOL | Q. S. |
| AGUA | Q. S. |
| PARA OBTET | 1000 cm. ³ |