

## TINTURA DE ARNICA

*Tinctura arnicae.*

ARNICA, FLÔRES, EM PÓ (I) . . . . .	200 g.
ALCOOL DILUIDO . . . . .	Q. S.

PARA OBTER . . . . . 1000 cm.<sup>3</sup>

Humedeça a droga com 500 cm.<sup>3</sup> do alcool diluido, introduza-a n'um percolador e, sem comprimir o pó, deixe em repouso, bem tampado o percolador, durante 24 horas; comprima então moderadamente a droga e proceda vagarosamente á percolação, adicionando mais alcool diluido; quando o percolato medir 250 cm.<sup>3</sup> suspenda o escoamento, faça macerar a droga durante mais 24 horas e continue a percolação até que o percolato total meça 500 cm.<sup>3</sup>; interrompa então a percolação, faça macerar a droga durante mais 12 horas ainda e depois recolha mais 250 cm.<sup>3</sup> de percolato; faça mais uma vez macerar a droga durante 12 horas e continue vagarosamente a percolação adicionando mais alcool diluido, até obter 1000 cm.<sup>3</sup> de tintura.

**Caracterização.**—Liquido amarello-pardacento, de cheiro forte da flôr de arnica e sabôr fracamente amargo.

Uma mistura de 2 volumes de tintura de arnica e de 1 volume de agua deve ser turva e de côr amarello-esverdeada; ajuntando-se ammonia a esta mistura, ella se colôre de pardo-esverdeado.

## TINTURA DE ARNICA SILVESTRE

*Tinctura solidago.*

ARNICA SILVESTRE, EM PÓ (I) . . . . .	200 g.
ALCOOL DILUIDO . . . . .	Q. S.

PARA OBTER . . . . . 1000 cm.<sup>3</sup>

Prepare esta tintura do mesmo modo que a TINTURA DE ARNICA.

**Caracterização.**—Liquido pardo-esverdeado, de cheiro aromatico forte e sabor amargo; pela addição de igual volume de agua, dá uma mistura turva.