

Ministério do Meio Ambiente

GUIA DE CAMPO

Vegetação do Cerrado
500 espécies



Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Biodiversidade e Florestas

GUIA DE CAMPO

Vegetação do Cerrado
500 espécies



Brasília - 2011

Catálogo na Fonte

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

M488g

Medeiros, João de Deus.

Guia de campo: vegetação do Cerrado 500 espécies / João de Deus Medeiros. –
Brasília: MMA/SBF, 2011.

532 p. : il. color. ; 29 cm. (Série Biodiversidade, 43)

ISBN 978-85-7338-160-9

1. Bioma Cerrado. 2. Vegetação do cerrado. 3. Manual. I. Ministério do Meio
Ambiente. II. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. III. Departamento de Florestas.
IV. Título. V. Série.

CDU(2.ed.)504.73(213.54)(036)

Agradecimentos

A elaboração desta publicação somente foi possível após longas e prazerosas jornadas por diversos recantos do Cerrado brasileiro, contando, na imensa maioria das vezes, com a colaboração e apoio de Márcia Stefani, que muito auxiliou nas fotos, identificação e revisão dos textos, Miriam Prochnow e Wigold Schaffer, sempre dispostos a desbravar novas trilhas e rumos nesse imenso cerrado.

Ao Maurício Mercadante, pelo apoio e acompanhamento no trabalho de busca por novos espécimes para registro, sempre estimulando e passando dicas valiosas.

Ao André Ribeiro e Fábio Ricarte, do Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, pelas informações relativas ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação.

À Iona'i Ossami de Moura, do Núcleo Cerrado e Pantanal do Departamento de Conservação da Biodiversidade da SBF, pelas informações sobre políticas públicas para o Cerrado.

Ao Gustavo Girão Braga, técnico da Confederação Nacional de RPPN, pela listagem de reservas particulares do Cerrado.

Ao Mauro Pires e Larissa Malty, do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento/MMA, nossos agradecimentos pelo apoio prestado no processo de diagramação.

E finalmente, à equipe do Departamento de Florestas da SBF pelo grande apoio prestado na fase de revisão das informações técnicas e organização dos dados. Nesse esforço agradeço o envolvimento do Fernando Coutinho Pimentel Tatagiba, Felipe Monteiro Diniz, Cristiane de Queiroz Pinheiro, Barbara Fabiana de Sena Bezerra, Luísa Resende Rocha, Luiz Sérvulo de Aquino, Roberta Magalhães Holmes, Tatiana Rehder, Hélio dos Santos Pereira, e as estagiárias Priscila Dytz e Mariana Rezende de Oliveira e Silva.

João de Deus Medeiros
DFLOR.SBF.MMA

Sumário

Apresentação.....	08
Como Utilizar o Guia de Campo	10
O Bioma Cerrado	12

Famílias Botânicas

Acanthaceae	16
Alstroemeriaceae	26
Amaranthaceae	28
Anacardiaceae	30
Annonaceae	36
Apocynaceae.....	43
Araliaceae	65
Arecaceae.....	67
Aristolochiaceae.....	79
Asteraceae.....	80
Begoniaceae.....	101
Bignoniaceae	102
Bixaceae	127
Bromeliaceae	129
Boraginaceae	135
Burseraceae	137
Cactaceae.....	138
Campanulaceae.....	146
Cannabaceae	149
Caryocaraceae	150
Celastraceae.....	151
Chrysobalanaceae	154
Clusiaceae.....	157
Combretaceae.....	166
Commelinaceae.....	167
Connaraceae	170
Convolvulaceae	171
Cyperaceae.....	180

Dennstaedtiaceae.....	182
Dilleniaceae.....	183
Droseraceae.....	185
Ebenaceae.....	187
Ericaceae.....	188
Eriocaulaceae.....	190
Erythroxylaceae.....	192
Euphorbiaceae.....	195
Fabaceae.....	205
Gentianaceae.....	264
Humiriaceae.....	273
Hypericaceae.....	274
Iridaceae.....	275
Lamiaceae.....	278
Lauraceae.....	283
Lecythidaceae.....	285
Loganiaceae.....	286
Loranthaceae.....	289
Lycopodiaceae.....	292
Lythraceae.....	293
Malpighiaceae.....	303
Malvaceae.....	319
Marantaceae.....	336
Marcgraviaceae.....	337
Mayacaceae.....	339
Melastomataceae.....	340
Meliaceae.....	391
Moraceae.....	393
Myristicaceae.....	394
Myrsinaceae.....	395
Myrtaceae.....	397
Nyctaginaceae.....	407
Onagraceae.....	409
Ochnaceae.....	410
Orchidaceae.....	414
Orobanchaceae.....	427

Oxalidaceae	431
Passifloraceae	433
Peraceae	436
Piperaceae.....	437
Poaceae	440
Polygalaceae	443
Polygonaceae	444
Proteaceae	446
Rhamnaceae	448
Rubiaceae	449
Rutaceae	468
Santalaceae.....	473
Sapindaceae.....	474
Sapotaceae	478
Siparunaceae	481
Simaroubaceae	482
Solanaceae	483
Styracaceae	485
Turneraceae	486
Urticaceae.....	487
Velloziaceae.....	489
Verbenaceae	493
Violaceae	502
Vitaceae	503
Vochysiaceae	505
Xyridaceae	514
Políticas Públicas para o Cerrado no âmbito do MMA	516
Unidades de Conservação da Natureza no Cerrado.....	521
Bibliografia	527



Apresentação

A publicação Guia de Campo da Vegetação do Cerrado – 500 espécies, que ora disponibilizamos ao público é uma contribuição do Departamento de Florestas (DFLOR.SBF.MMA) voltada ao esforço de difusão de informações referentes ao bioma Cerrado, procurando com isso sensibilizar e conscientizar o grande público do valor e importância estratégica desse bioma para a conservação da biodiversidade brasileira.

A publicação traz informações básicas sobre 500 espécies de ocorrência no bioma, acompanhadas de fotografias obtidas de exemplares crescendo em condições naturais, a maioria delas em unidades de conservação da natureza. Com ela os visitantes dessas áreas protegidas terão condições e um estímulo adicional para observar e admirar a bela e diversificada flora do Cerrado.

No Brasil, embora os avanços obtidos no alcance das metas nacionais de biodiversidade da CDB não tenham sido homogêneos, uma destas foi integralmente cumprida, a que se refere a publicação de listas e catálogos das espécies brasileiras (meta 1.1). Destacamos aqui o lançamento da “Lista de Espécies da Flora do Brasil” (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/>), editada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 2010. Com a edição desta Lista o MMA contribui com a implementação da Estratégia Global para a Conservação de Plantas (GSPC), facilitando o consenso e a sinergia nos níveis global, nacional, regional e local para impulsionar o conhecimento e a conservação de plantas.

Com a disponibilização deste Guia de Campo da Vegetação do Cerrado procuramos difundir, de maneira mais simples e direta, uma parcela ainda pequena dessa grande quantidade de espécies vegetais que figuram na “Lista de Espécies da Flora do Brasil”, focando as plantas do bioma Cerrado. É uma complementação numericamente ainda modesta, considerando que somente de Angiospermas a Lista de Espécies da Flora do Brasil elenca 31.156 espécies, porém significativa na perspectiva de popularizar e ampliar a difusão do conhecimento sobre a biodiversidade nacional, em sintonia com as diretrizes de ações do Ano Internacional das Florestas.

Braulio Ferreira de Souza Dias
Secretário de Biodiversidade e Florestas



Como utilizar este Guia de Campo

A publicação Guia de Campo da Vegetação do Cerrado procura disponibilizar informações básicas sobre 500 espécies de ocorrência no bioma, acompanhadas de fotografias obtidas de exemplares crescendo em condições naturais, na imensa maioria dos casos, no espaço de unidades de conservação da natureza. Com a disponibilização desta publicação procuramos estimular o melhor aproveitamento da visitação a estas unidades, incentivando a observação mais detida das espécies vegetais protegidas nesses espaços, tornando assim a visita mais instrutiva e atraente.

Todas as espécies estão identificadas com seu nome científico, seguindo a nomenclatura botânica adotada na “Lista de Espécies da Flora do Brasil” (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/>), editada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As espécies estão agrupadas pela respectiva família botânica, com a informação complementar referente as designações populares mais conhecidas e difundidas, quando existentes, o habito e o tipo de ambiente que a espécie ocupa, a sua área de distribuição, indicada pela sigla dos estados onde a espécie ocorre e, por último a indicação do local onde foi obtida a foto do espécime. As designações de habito e ambiente seguem os registros da obra “Cerrado: ecologia e flora” (Sano, Almeida & Ribeiro, 2008).

As fotos selecionadas procuram retratar aspectos diagnósticos da espécie, facilitando assim sua identificação em campo. Em alguns casos, seguindo essa orientação, fotos adicionais, em dimensão menor, foram incluídas.

Todas as fotos usadas nesta publicação estão disponíveis na página do autor no flickr (<http://www.flickr.com/>), na condição “creative commons” não comercial, o que significa que os arquivos estão disponíveis, permitindo trabalhos derivados, mas somente para propósitos não comerciais. Algumas fotos são de autoria de Márcia Stefani e são identificadas com a sigla MS, todas as demais são fotos do autor, João de Deus Medeiros, responsável também pela identificação botânica das espécies. Sugestões e críticas que possam aprimorar este trabalho são bem vindas, e poderão ser postadas no referido espaço virtual do flickr.



O Bioma Cerrado

O bioma Cerrado cobre aproximadamente 22% do território nacional, figurando como segundo maior bioma brasileiro. Localiza-se em uma grande área do Brasil Central, fazendo fronteira com outros importantes biomas: Amazônia ao norte, Caatinga a nordeste, Pantanal a sudoeste e Mata Atlântica a sudeste. Além disso, e também decorrente da dinâmica histórica dos ecossistemas, existem encraves de vegetação de Cerrado em outros domínios de vegetação, como as áreas de Cerrado no estado de Roraima, Amapá, Amazonas (Campos de Humaitá), Rondônia (Serra dos Pacaás Novos), Pará (Serra do Cachimbo), Bahia (Chapada Diamantina) e para o sul do estado de São Paulo e Paraná. A fauna e flora do Cerrado são extremamente ricas, e a sua vegetação nativa, em graus variados de conservação, ainda cobre 60,42% do bioma no Brasil.

O bioma Cerrado abriga mais de 11.000 espécies vegetais, das quais 4.400 são endêmicas, além de uma grande variedade de vertebrados terrestres e aquáticos e elevado número de invertebrados. No Cerrado a heterogeneidade espacial é um fator determinante para a ocorrência dessa diversidade de espécies. Os ambientes do Cerrado variam significativamente no sentido horizontal, sendo que áreas campestres, florestais e brejosas podem existir em uma mesma região. Essa enorme biodiversidade qualifica o Cerrado como a savana mais rica do mundo. Além dessa rica biodiversidade, o Cerrado se destaca como

berço das águas, abrigando as nascentes dos principais rios das bacias Amazônica, da Prata e do São Francisco, e como base de sobrevivência cultural e material de um sem-número de habitantes, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, geraizeiros, dentre outros, que têm no uso de seus recursos naturais a fonte de sua subsistência.

A típica vegetação do Cerrado se caracteriza pelos troncos tortuosos, baixo porte, ramos retorcidos, cascas espessas e folhas grossas. É importante ressaltar que a vegetação não apresenta essa característica em decorrência da escassez de água, já que o Cerrado abriga densa rede hídrica, mas devido a outros fatores edáficos, notadamente o desequilíbrio no teor de micronutrientes, a exemplo do alumínio.

Destaca-se que a vegetação do Cerrado “*sensu lato*” não possui uma fisionomia única em toda a sua extensão. Ela é bastante diversificada, apresentando desde associações campestres abertas, até associações florestais densas, como os cerradões. Entre estes dois extremos fitofisionômicos, viceja uma gama de associações intermediárias, caracterizando o Cerrado como um verdadeiro mosaico de formas fisionômicas.

O bioma Cerrado é um dos que mais sofreu com a ocupação humana, sendo superado apenas pela Mata Atlântica. A pressão crescente para o desmatamento de novas áreas para expansão agropecuária está levando à exaustão progressiva dos recursos naturais da região. As florestas do Cerrado são também tremendamente afetadas pela extração predatória para produção de

carvão. A conjugação desses fatores posiciona o Cerrado como um *hotspot* de biodiversidade e desperta especial atenção para a conservação dos seus recursos naturais.

A grande riqueza de espécies no Cerrado, associada a heterogeneidade na distribuição das mesmas, faz com que as estratégias de conservação *in situ*, particularmente com a expansão das áreas protegidas sob a forma de Unidades de Conservação da Natureza, se deparem com enormes desafios. Além das conhecidas ameaças a conservação da biodiversidade, as peculiaridades do Cerrado tornam muitas áreas do seu domínio como espaços únicos e insubstituíveis, o que remete a necessidade de grande esforço para ampliar o nosso conhecimento sobre a riqueza biológica que esse bioma abriga, e assim superar as lacunas nas estratégias de conservação.

A presente publicação procura contribuir com esse esforço ao disponibilizar um guia de campo que auxilie na identificação das espécies vegetais que ocorrem no bioma Cerrado. O objetivo maior é sensibilizar o grande público, destacando a enorme diversidade e beleza das espécies de plantas que ocorrem no Cerrado, e com isso ampliar a conscientização sobre a importância e o valor intrínseco desse bioma e, fundamentalmente, incentivar essa prazerosa atividade que é a observação e contemplação da nossa bela e rica flora do Cerrado.





ACANTHACEAE

Clistax brasiliensis, ACANTHACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria; **Distribuição:** AM, PA, MA, CE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros – Cavalcante – GO.



Justicia lanstyakii, ACANTHACEAE – **Hábito:** Erva, subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado (*lato sensu*), campo sujo, campo limpo; **Distribuição:** MT, GO, DF; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília – Brasília - DF.



Justicia phyllocalyx, ACANTHACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo Sujo, Campo Úmido; **Distribuição:** MT, GO, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Lepidagathis floribunda, ACANTHACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, mata seca (de encosta), cerradão, cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** TO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional Grande Sertão Veredas - Chapada Gaúcha - MG.



Ruellia affinis, ACANTHACEAE – **Hábito:** Subarbusto ou trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, mata seca, campo rupestre (*lato sensu*), transição com mata atlântica; **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Ruellia geminiflora, ACANTHACEAE – **Hábito:** Subarbusto ou erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata ciliar, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo limpo, campo rupestre (*lato sensu*), savanas amazônicas, área antrópica; **Distribuição:** AM, PA, MA, CE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Ruellia incommata, ACANTHACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata ciliar, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** RO, BA, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Ruellia puri, ACANTHACEAE - Ruélia azul - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado (*lato sensu*), campo limpo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, RO, MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Ruellia simplex, ACANTHACEAE - Ruélia azul – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata, savanas amazônicas; **Distribuição:** MT, SP, RS; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Ruellia villosa, ACANTHACEAE – **Hábito:** Subarbusto ereto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado (*stricto sensu*), campo úmido, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, GO, DF, MG; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



ALSTROEMERIACEAE

Alstroemeria plantaginea, ALSTROEMERIACEAE –
Hábito: Erva ereta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata, Cerrado Rupestre, Campo Sujo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás. - GO



Alstroemeria stenopetala, ALSTROEMERIACEAE
- **Hábito:** Erva ereta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Úmido; **Distribuição:** GO, DF; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



AMARANTHACEAE

Gomphrena arborescens (Sin: *Gomphrena officinalis*),
AMARANTHACEAE - Para-tudo – **Hábito:** Subarbusto
ereto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto
sensu*), Campo Sujo, *Campo Rupestre (lato sensu)*;
Distribuição: MT, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:**
Parque Nacional de Brasília - Brasília – DF



Gomphrena scapigera, AMARANTHACEAE – **Hábito:** Subarbusto ereto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, *Campo Rupestre (lato sensu)*; **Distribuição:** BA e MG; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



ANACARDIACEAE

Anacardium humile, ANACARDIACEAE - cajuí -
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo Rupestre (*stricto sensu*); **Distribuição:** TO, RO, PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF



Anacardium occidentale, ANACARDIACEAE - Cajueiro
– **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Savanas Amazônicas; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, AC, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** RPPN Fazenda Vaga-Fogo – Pirenópolis - GO.



Lithrea molleoides, ANACARDIACEAE - Aroeira-branca – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca Semidecídua, Transição com Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Myracrodruon urundeuva, ANACARDIACEAE - Aroeira
– **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata Seca (Semidecídua, Decídua), Carradão, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** TO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Formosa – GO. **Espécie Ameaçada de Extinção (IN MMA 06/2008).**



Schinus terebinthifolius, ANACARDIACEAE - Aroeira-vermelha – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Área antrópica; **Distribuição:** PE, BA, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Tapirira guianensis, ANACARDIACEAE - Camboatá, pau-pombo – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, mata seca semidecídua, cerrado, cerrado denso, vereda, savanas amazônicas; **Distribuição:** PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



ANNONACEAE

Annona crassiflora, ANNONACEAE - Araticum grande, pinha-do-cerrado – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda; **Distribuição:** PA, TO, MA, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Annona monticola, ANNONACEAE - Marolo - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo; **Distribuição:** MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Cardiopetalum calophyllum, ANNONACEAE - Pindaíba-vermelha, embira – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo; **Distribuição:** PA, AM, TO, AC, RO, PI, RN, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Duguetia fufuracea, ANNONACEAE - Araticum, Marolo
– **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Carrasco; **Distribuição:** RO, CE, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília – DF.



Xylopia aromatica, ANNONACEAE - Pimenta-de-macaco, Pindaíba, Embira - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata Seca, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Savanas amazônicas; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, RO, MA, PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Xylopia emarginata, ANNONACEAE - Envira, Pindaíba - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria Inundável; **Distribuição:** AP, PA, AM, RO, PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Xylopia sericea, ANNONACEAE - Pimenta-de-macaco
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão; **Distribuição:** RR, PA, AM, RO, MA, PI, CE, PE, BA, MT, GO, DF, MG, ES, RJ, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



APOCYNACEAE

Allamanda angustifolia, APOCYNACEAE - Alamanda
- **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado ralo, campo sujo, campo limpo, campo rupestre (*stricto sensu*); **Distribuição:** GO; **Local da foto:** Parque Nacional Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Aspidosperma macrocarpon, APOCYNACEAE - Peroba, pereiro - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Seca Semidecídua, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Cristalina - GO.



Aspidosperma tomentosum, APOCYNACEAE -
Guatambú-do-cerrado, peroba-do-campo - **Hábito:**
Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Seca,
Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** AC,
MA, PI, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR, SC;
Local da foto: Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Barjonia cymosa, APOCYNACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** RO, MT, GO, MS; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Hancornia speciosa, APOCYNACEAE - Mangaba –
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, savanas amazônicas;
Distribuição: AM, PA, AM, TO, RO, MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Himatanthus obovatus, APOCYNACEAE - Pau-de-leite - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), savanas amazônicas; **Distribuição:** PA, TO, RO, MA, PI, BA, SE, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Macroditassa adnata, APOCYNACEAE - **Hábito:** Subarbusto volúvel ou trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata ciliar, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Estadual Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Mandevilla velame (Sin: *Macrosiphonia velame*),
APOCYNACEAE - Velame-branco - **Hábito:** Subarbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*stricto sensu*),
Campo Sujo; Distribuição: GO, DF, MG, SP, RS; **Local da
foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Mandevilla antennacea, APOCYNACEAE – **Hábito:** Trepadeira herbácea volúvel; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, mata; **Distribuição:** AC, MT, DF; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis – GO.



Mandevilla hirsuta, APOCYNACEAE - **Hábito:** Trepadeira herbácea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, margem de córrego, cerrado (*lato sensu*), savanas amazônicas; **Distribuição:** RR, PA, AM, AC, RO, MA, PI, CE, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Mandevilla illustris, APOCYNACEAE - Jalapa, Jalapa do campo - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo; **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MG, SP, PR, RS; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Mandevilla martiana, APOCYNACEAE - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar; **Distribuição:** BA, MG; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Mandevilla myriophylla, APOCYNACEAE - Batata-de-vaqueiro - **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria, Campo Limpo, Campo Úmido, Brejo; **Distribuição:** GO, DF; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Mandevilla tenuifolia, APOCYNACEAE - Batata-de-vaqueiro - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sensu*), Brejo; **Distribuição:** PA, PB, BA, MT, GO, DF, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Odontadenia lutea, APOCYNACEAE - Flor-de-veado
- **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), vereda, campo sujo, campo limpo; **Distribuição:** PA, AM, BA, MT, GO, DF, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Oxypetalum erectum, APOCYNACEAE - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerrado, Capoeira; **Distribuição:** RO, BA, MT, GO, DF, MG, SP, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Prestonia coalita, APOCYNACEAE – **Hábito:** Trepadeira herbácea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, mata seca, cerrado (*lato sensu*), campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** AC, CE, MT, MG, ES, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás – GO.



Prestonia erecta, (Sin: *Rhodacalyx rotundifolius*)
APOCYNACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia**
ou Habitat: Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo
sujo; **Distribuição:** PA, TO, MA, PI, BA, MT, GO, DF, MS,
MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Schubertia grandiflora, APOCYNACEAE - Cipó-de-leite - **Hábito:** Trepadeira perene; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, AM, TO, RO, MA, PI, CE, PB, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Stipecoma peltigera, APOCYNACEAE - **Hábito:** Trepadeira herbácea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*), carrasco; **Distribuição:** BA, MT, GO, MG; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Tabernaemontana hystrix, APOCYNACEAE - Leiteira -
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado
(*stricto sensu*), Área antrópica, Ruderal; **Distribuição:**
BA, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Campus da
Universidade de Brasília (UnB) – Brasília -DF.



Temnadenia violacea, APOCYNACEAE - **Hábito:** Trepadeira herbácea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** MA, CE, PE, BA, SE, GO, DF, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



ARALIACEAE

Dendropanax cuneatus, ARALIACEAE - Pau-de-tamanco
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria; **Distribuição:** PA, TO, AC, RO, BA, MT, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília – DF.



Schefflera macrocarpa, ARALIACEAE - Mandiocão -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de
mata de galeria, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo
ruprestre (*lato sensu*), carrasco; **Distribuição:** BA, MT, GO,
DF, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília -
Brasília - DF.



ARECACEAE

Acrocomia aculeata, ARECACEAE - Macaúba – **Hábito:** Arbórea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata seca, cerrado, cerrado (*lato sensu*), palmeiral, área antrópica; **Distribuição:** RO, PA, AM, TO, MA, CE, BA, GO, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Attalea brasiliensis, ARECACEAE - Babaçu - **Hábito:** Arbórea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, mata seca, cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** GO, DF; **Local da foto:** Edilândia – GO. **Espécie Ameaçada de Extinção (IN MMA 06/2008).**



Attalea geraensis, ARECACEAE - Andaia, indaiá - **Hábito:** Palmeira acaule; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata seca, cerrado (*stricto sensu*), área antrópica; **Distribuição:** BA, GO, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional do Grande Sertão Veredas - Chapada Gaúcha - MG.



Butia archeri, ARECACEAE - Butiá - **Hábito:** Arbustiva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo úmido; **Distribuição:** GO, MG, SP; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Geonoma brevispatha, ARECACEAE - Ubim, cana-preta
- **Hábito:** Arbustiva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria; **Distribuição:** PA, TO, AC, RO, BA, GO, DF, MS, MG; **Local da foto:** Estação Ecológica do IBGE - Brasília - DF.



Mauritia flexuosa, ARECACEAE - Buriti - **Hábito:** Arbórea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, vereda, palmeiral, brejo, savanas amazônicas; **Distribuição:** AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, BA, MG, SP; **Local da foto:** Reserva Extrativista do Recanto das Araras de Terra Ronca - São Domingos - GO.



Mauritiella armata, ARECACEAE - Buritirana, Caranã – **Hábito:** Arbórea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria inundável, vereda, palmeiral, brejo, savanas amazônicas; **Distribuição:** RR, PA, AM, TO, AC, RO, PI, PE, BA, MT, GO, MG; **Local da foto:** Reserva Extrativista do Recanto das Araras de Terra Ronca - São Domingos – GO.



Syagrus comosa, ARECACEAE - Catolé - **Hábito:** Arbustiva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerradão, cerrado (ralo rupestre), campo sujo; **Distribuição:** PA, TO, PI, BA, MT, GO, MG; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Syagrus flexuosa, ARECACEAE - Acumã, coco-babão –
Hábito: Arbustiva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo; **Distribuição:** TO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Syagrus glaucescens, ARECACEAE - Coco-de-pedra, palmeirinha azul - **Hábito:** Arbustiva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MG; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



Syagrus petraea, ARECACEAE - Ariri, tucum-de-índio –
Hábito: Palmeira acaule (Arbustiva); **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo limpo, carrasco; **Local da foto:** Parque Nacional do Grande Sertão Veredas - Chapada Gaúcha - MG.



Syagrus romanzoffiana, ARECACEAE - Gerivá, jerivá -
Hábito: Arbórea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, mata seca, cerradão, cerrado (*lato sensu*);
Distribuição: BA, GO, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS;
Local da foto: Campus da UnB - Brasília - DF.



ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia galeata, ARISTOLOCHIACEAE -
milhomens, papo-de-peru - **Hábito:** Trepadeira
arbustiva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata
seca semidecídua, cerrado (*lato sensu*), área antrópica;
Distribuição: TO, CE, GO, DF, MG, ES, SP, RJ; **Local da
foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



ASTERACEAE

Achyrocline alata, ASTERACEAE - Macela, macela-dobrejo - **Hábito:** Subarbusto erecto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), vereda, campo sujo, campo limpo, campo úmido, brejo; **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Achyrocline satureioides, ASTERACEAE - Macela -
Hábito: Erva perene; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata, cerrado (*lato sensu*), vereda, campo sujo, campo limpo, campo rupestre (*lato sensu*), brejo;
Distribuição: BA, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Aspilia foliacea, ASTERACEAE - Bem-me-quer – **Hábito:** Erva ereta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo limpo, campo úmido, campo rupestre (*lato sensu*), ambiente rupestre, área antrópica; **Distribuição:** RO, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Baccharis dracunculifolia, ASTERACEAE - alecrim-de-vassoura, vassourinha - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata, cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Chresta curumbensis, ASTERACEAE – **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado (*stricto sensu*), campo limpo; **Distribuição:** MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Chresta sphaerocephala, ASTERACEAE - João-bobo
- **Hábito:** Erva ereta ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo rupestre (*stricto sensu*); **Distribuição:** BA, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Eremanthus glomeratus, ASTERACEAE - Coração-de-negro - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo rupestre (*stricto sensu*); **Distribuição:** BA, GO, DF, MG; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Ichthyothere connata, ASTERACEAE - **Hábito**:- Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat**: Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo rupestre (*stricto sensu*); **Distribuição**: GO; **Local da foto**: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



MS

Ichthyothere elliptica, ASTERACEAE - **Hábito:** Erva decumbente; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo rupestre (*stricto sensu*); **Distribuição:** GO; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Lepidaploa aurea, ASTERACEAE - Assa-peixe – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerrado ralo, campo sujo, campo limpo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** TO, BA, MT, GO, DF, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Campus da Universidade de Brasília (UnB) – Brasília -DF.



Lepidaploa cotoneaster, ASTERACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), campo rupestre (*stricto sensu*), restinga; **Distribuição:** BA, MG, SP; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Chapada Diamantina - Palmeiras – BA.



Lychnophora pinaster, ASTERACEAE - Arnica – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo limpo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MG; **Local da foto:** Serra do Espinhaço - Diamantina – MG.



Lychnophora salicifolia, ASTERACEAE - Arnica – **Hábito:** Arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), campo úmido, campo limpo, campo rupestre (*lato sensu*), carrasco; **Distribuição:** BA, GO, DF, MG; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada Diamantina - Palmeiras - BA.



Lychnophora sellowii, ASTERACEAE - Arnica - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo limpo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MG; **Local da foto:** Estrada Real - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



Lychnophora triflora, ASTERACEAE - Arnica - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Chapada Diamantina - Palmeiras - BA.



Lychnophora villosissima, ASTERACEAE - Arnica -
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado
(*lato sensu*), Campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:**
MG; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus
- Pirenópolis - GO.



Mikania argyrea, ASTERACEAE – **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, transição com mata atlântica; **Distribuição:** BA, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília – DF.



Mikania sessilifolia, ASTERACEAE - Guaco - **Hábito:** Subarbusto ereto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, campo sujo, campo úmido, Campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, MT, DF, MG, SP, PR, SC; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Paralychnophora harleyi, ASTERACEAE - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Chapada Diamantina - Palmeiras - BA.



Piptocarpha rotundifolia, ASTERACEAE - Coração-de-negro - **Hábito:** Arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, savanas amazônicas; **Distribuição:** RO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Pseudobrickellia brasiliensis, ASTERACEAE – **Hábito:** Arbusto Ereto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo Rupestre (*lato sensu*), Área Antrópica, Carrasco; **Distribuição:** AM, TO, RO, PI, CE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Estrada Real - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



BEGONIACEAE

Begonia grisea, BEGONIACEAE - Begônia - **Hábito:** Erva rupícola ou terrestre; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, cerrado (lato sensu), Campo rupestre (*lato sensu*), carrasco; **Distribuição:** PE, BA, MG; **Local da foto:** Parque Natural Municipal do Morro do Pai Inácio - Chapada Diamantina - Palmeiras - BA.



BIGNONIACEAE

Adenocalymma nodosum, BIGNONIACEAE - Carobinha-do-campo - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata seca semidecídua, cerradão, cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** TO, PI, MT, GO, MG, RJ; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Padre Bernardo - GO.



Adenocalymma pedunculatum, BIGNONIACEAE –
Hábito: Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo; **Distribuição:** PA,
TO, MA, BA, MT, GO, MG, ES, SP; **Local da foto:** Reserva
Biológica da Contagem -Brasília – DF.



Adenocalymma peregrinum, BIGNONIACEAE -
Ciganinha - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia
ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo;
Distribuição: MT, GO, MS, MG, SP, RJ, PR, DF; **Local
da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Anemopaegma arvense, BIGNONIACEAE - Alecrim-do-campo, catuaba - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado ralo, Campo sujo rupestre (*stricto sensu*); **Distribuição:** TO, RO, MA, BA, MT, GO, MS, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Anemopaegma glaucum, BIGNONIACEAE - Catuaba -
Hábito: Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado
(*stricto sensu*), campo sujo; **Distribuição:** PA, TO, RO, MA,
PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque
Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Fridericia platyphylla (Sin: *Arrabidaea brachypoda*),
BIGNONIACEAE - Tinteiro – **Hábito:** Subarbusto ereto;
Fitofisionomia ou Habitat: Borda de mata de galeria,
cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: RR, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, PB, BA, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Fridericia florida (Sin: *Arrabidaea florida*),
BIGNONIACEAE - Cipó-cheiroso - **Hábito:** Trepadeira;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata de galeria, cerradão,
cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO,
AC, RO, MA, PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local
da foto:** Pires do Rio - GO.



Cuspidaria pulchra (Sin: *Arrabidaea pulchra*),
BIGNONIACEAE - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia
ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, cerradão,
cerrado (lato sensu), carrasco; **Distribuição:** GO, DF,
MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília
- Brasília - DF.



Cuspidaria floribunda, BIGNONIACEAE - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, capoeira; **Distribuição:** AM, AC, RO, MT, GO, MS, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Cybistax antisiphilitica, BIGNONIACEAE - ipê-mirim, ipê-verde - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, savanas amazônicas; **Distribuição:** PA, TO, MA, PI, CE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Amphiphium elongatum (Sin: *Distictella elongata*),
BIGNONIACEAE - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia**
ou Habitat: Mata ciliar, capoeira; **Distribuição:** RO,
AM, PA, AM, TO, RR, BA, MT, GO, MS, MG, SP, PR; **Local**
da foto: Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Jacaranda caroba, BIGNONIACEAE - Caroba - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo rupestre (*lato sensu*), savanas amazônicas; **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



Jacaranda cuspidifolia, BIGNONIACEAE - Caroba, guazú
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata seca, cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Jacaranda grandifoliolata, BIGNONIACEAE - Caroba, carobinha- **Hábito:** arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Chapada Diamantina - Palmeiras - BA.



Jacaranda irwinii, BIGNONIACEAE - Caroba - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata, campo rupestre (*lato sensu*), carrasco; **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada Diamantina - Palmeiras - BA.



Jacaranda macrantha, BIGNONIACEAE - Carobinha, caroba - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata; **Distribuição:** MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Jacaranda crystallana (Sin: *Jacaranda aulei*), BIGNONIACEAE
- Carobinha - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerrado (*stricto sensu*), campo; **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Bignonia corymbosa (Sin: *Phryganocydia corymbosa*),
BIGNONIACEAE - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia
ou Habitat:** Mata de galeria, cerradão, cerrado (*lato sensu*);
Distribuição: PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, BA, MT,
GO, MS, MG, ES, RJ; **Local da foto:** Jardim Botânico de
Brasília - Brasília - DF.



Pyrostegia venusta, BIGNONIACEAE - Cipó-de-são-joão - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata seca semidecídua, cerrado (*lato sensu*), ruderal, cultivada; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Tabebuia aurea, BIGNONIACEAE - ipê-amarelo, pau d'arco - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, mata seca, cerradão, cerrado (*lato sensu*), savanas amazônicas; **Distribuição:** AP, PA, AM, TO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Handroanthus heptaphyllus (Sin.: *Tabebuia heptaphylla*),
BIGNONIACEAE - Piúva - **Hábito:** Árvore;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata ciliar, mata de galeria,
transição com mata atlântica; **Distribuição:** BA, MT,
GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** APA
do Planalto Central - Brasília - DF.



Handroanthus impetiginosus (Sin.: *Tabebuia impetiginosa*),
BIGNONIACEAE - Ipê-roxo - **Hábito:** Árvore;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata ciliar, mata seca
(semidecídua, decídua); **Distribuição:** PA, TO, MA, PI, CE,
RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ;
Local da foto: APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Handroanthus ochraceus (Sin.: *Tabebuia ochracea*),
BIGNONIACEAE - Ipê-amarelo-do-cerrado, piúva-
cascuda - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerradão, cerrado (*sensu stricto*), campo com Murundus,
campo rupestre (*lato sensu*), savanas amazônicas;
Distribuição: PA, TO, MA, PI, CE, PB, BA, MT, GO, DF,
MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Olhos
D'Água - Brasília - DF.



Tabebuia roseoalba, BIGNONIACEAE - Ipê-branco -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria não inundável, mata seca; **Distribuição:** PA, TO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF



Zeyheria montana, BIGNONIACEAE - Bolsa de pastor, mandioquinha do campo - Hábito: Arvoreta ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, TO, MA, PI, BA, MT, GO, DF, MG, SP, PR; **Local da foto:** Campus da Universidade de Brasília (UnB) - Brasília -DF.



BIXACEAE

Bixa orellana, BIXACEAE - Urucum - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, mata, cerrado; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, CE, BA, MT, GO, MG, ES, SP, RS; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Cochlospermum regium, BIXACEAE - Algodão-do-campo - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** AP, AM, MA, RN, MT, GO, DF, MS, MG, PR; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



BROMELIACEAE

Aechmea bromeliifolia, BROMELIACEAE - Bromélia
- **Hábito:** Erva epífita ou ripícola; **Fitofisionomia
ou Habitat:** Mata, cerradão, cerrado (*lato sensu*);
Distribuição: RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, CE, PB,
BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR, SC, RS; **Local da foto:**
Parque Estadual Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Ananas ananassoides, BROMELIACEAE - Abacaxizinho-do-cerrado - **Hábito:** Erva terrestre; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), vereda, savanas amazônicas; **Distribuição:** AP, PA, AM, TO, RO, CE, PB, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Dyckia trichostachya, BROMELIACEAE – **Hábito:** Erva terrestre; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** MG, ES; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Orthophytum amoenum, BROMELIACEAE – **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo rupestre (*lato sensu*); BA; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada Diamantina - Palmeiras – BA. **Espécie Ameaçada de Extinção (IN MMA 06/2008).**



Tillandsia streptocarpa, BROMELIACEAE – **Hábito:** Erva epífita ou ripícola; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata seca, cerrado (*lato sensu*), Campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PI, RN, PB, PE, BA, AL, MG, SP, PR, RS; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros – Cavalcante – GO.



Vriesea atra, BROMELIACEAE - **Hábito:** Erva;
Fitofisionomia ou Habitat: Campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** RJ; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras - BA.



BORAGINACEAE

Cordia glabrata, BORAGINACEAE - Louro-preto -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, mata seca, cerradão, cerrado (*lato sensu*);
Distribuição: PA, PI, BA, MT, GO, MS, MG; **Local da foto:** Reserva Extrativista do Recanto das Araras de Terra Ronca - São Domingos - GO.



Cordia superba, BORAGINACEAE - Babosa-branca
- **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Mata de galeria, transição com cerrado (*lato sensu*);
Distribuição: MA, PE, BA, MG, RJ, PR; **Local da foto:**
Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



BURSERACEAE

Protium ovatum, BURSERACEAE - Breu - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata ciliar, mata seca decídua, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, carrasco; **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



CACTACEAE

Cipocereus minensis, CACTACEAE - Rabo-de-raposa, Quiabo-do-inferno - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo rupestre (*lato sensu*), carrasco; **Distribuição:** MG; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



Discocactus placentiformis, CACTACEAE - **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MG; **Local da foto:** Salto do Itiquira - Formosa - GO.



Micranthocereus estevesii, CACTACEAE – **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata seca, campo rupestre
(*lato sensu*); **Distribuição:** TO, GO, MG; **Local da foto:**
Parque Estadual Terra Ronca - São Domingos – GO.



Micranthocereus purpureus, CACTACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), Campo rupestre (*lato sensu*), ambiente rupestre, transição com caatinga; **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Chapada Diamantina - Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras - BA.



Pereskia aculeata, CACTACEAE - Surucurú, ora-pro-nobis
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado,
Mata galeria, transição com caatinga; **Distribuição:** AL,
BA, ES, GO, MA, MG, PE, PR, RJ, SC, SE, SP; **Local da
foto:** BR 242 - Cristópolis - BA.



Pilosocereus diersianus, CACTACEAE – **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata seca, campo rupestre
(*lato sensu*); **Distribuição:** BA, MG; **Local da foto:** Parque
Estadual de Terra Ronca - São Domingos - GO.



Pilosocereus pachycladus, CACTACEAE - Facheiro, Mandacaru-de-facho - **Fitofisionomia ou Hábito:** Arbusto; **Habitat:** Mata seca, cerrado rupestre, campo rupestre (*lato sensu*), transição com caatinga; **Distribuição:** PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, MG; Chapada Diamantina. **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras - BA.



Pilosocereus vilaboensi, CACTACEAE – **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata seca, campo rupestre
(*lato sensu*); **Distribuição:** GO; **Local da foto:** Parque
Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



CAMPANULACEAE

Centropogon cornutus, CAMPANULACEAE - Aninga –
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, vereda, campo sujo, campo rupestre (*lato sensu*), brejo; **Distribuição:** RR, PA, AM, AC, RO, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Siphocampylus imbricatus, CAMPANULACEAE –
Hábito: Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata seca (de encosta), campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, MG; **Local da foto:** Chapada Diamantina - Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras - BA



Siphocampylus lycioides, CAMPANULACEAE – **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo limpo; **Distribuição:** GO, SP, PR; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



CANNABACEAE

Trema micrantha, CANNABACEAE - Grandiúva, candiúba - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, transição com cerrado, área antrópica; **Distribuição:** Em todo o Brasil; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



CARYOCARACEAE

Caryocar brasiliense, CARYOCARACEAE - Pequi – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo com murundus, carrasco; **Distribuição:** PA, TO, MT, GO, DF, MG, SP, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



CELASTRACEAE

Cheiloclinium cognatum, CELASTRACEAE - Bacupari-da-mata - **Hábito**:- Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat**: Mata ciliar, mata de galeria; **Distribuição**: RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto**: Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Plenckia populnea, CELASTRACEAE - Marmeleiro -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo com murundus; **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Salacia crassifolia, CELASTRACEAE - Bacupari – **Hábito:** Arvoreta ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata ciliar, cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** TO, RO, PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



CHRYSOBALANACEAE

Hirtella glandulosa, CHRYSOBALANACEAE – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, cerradão, transição com cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre; (*lato sensu*), savanas amazônicas; **Distribuição:** AP, PA, AM, MA, PI, CE, BA, MT, GO, DF, MS; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Hirtella gracilipes, CHRYSOBALANACEAE - Bosta-de-cabra - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, cerradão; **Distribuição:** PA, TO, RO, PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Área de Relevante Interesse Ecológico do Riacho Fundo - Brasília - DF.



Licania humilis, CHRYSOBALANACEAE – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** RO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



CLUSIACEAE

Calophyllum brasiliense, CLUSIACEAE - Guanandi, Jacaréúba - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria; **Distribuição:** RR, PA, AM, AC, MT, GO, MG, ES, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Clusia burchellii, CLUSIACEAE - Gameleira - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, mata seca, cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** GO; **Local da foto:** Parque Estadual Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Clusia gardneri, CLUSIACEAE - **Hábito:** Árvore;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata de galeria, cerrado
(*lato sensu*); **Distribuição:** GO; **Local da foto:** Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Clusia nemorosa, CLUSIACEAE - Apuí, Mucugê-bravo
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata
ciliar, mata de galeria (de encosta), campo rupestre (*lato
sensu*), savanas amazônicas; **Distribuição:** RR, AP, PA,
AM, CE, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MG, ES, RJ; **Local
da foto:** Parque Nacional da Chapada Diamantina -
Palmeiras - BA.



Clusia weddelliana, CLUSIACEAE – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar; **Distribuição:** PA, TO, AC, RO, MA, CE, MT, GO, DF; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Kalmegh coriacea, CLUSIACEAE - Pau-santo - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado, cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** PA, AM, RO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Kilmeyera neriifolia, CLUSIACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*), carrasco; **Distribuição:** Nordeste, GO, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Kielmeyera rubriflora, CLUSIACEAE - Rosa-do-campo -
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo úmido, campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: PA, RO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Kilmeyera speciosa, CLUSIACEAE - Pau-santo - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, Cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** GO, DF, MG; **Local da foto:** Parque da Cidade - Brasília - DF.



COMBRETACEAE

Terminalia fagifolia, COMBRETACEAE - Capitão-do-mato, Cambiú, Maçambê - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata seca, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MA, PI, CE, BA, MT, GO, DF, MS, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



COMMELINACEAE

Dichorisandra villosula, COMMELINACEAE – **Hábito:** Erva ou trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado (*lato sensu*), brejo, transição com pantanal; **Distribuição:** PA, AM, TO, AC, RO, MG; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Tripogandra diuretica, COMMELINACEAE – **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, brejo; **Distribuição:** AM, MA, PE, BA, MT, DF, MG, SP, RJ, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



CONNARACEAE

Connarus suberosus, CONNARACEAE - Araruta-do-campo - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, carrasco; **Distribuição:** PA, TO, MA, PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Rourea induta, CONNARACEAE - Chapeudinha, Pau de porco – **Hábito:** Arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo com murundus, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, TO, RO, MA, PI, CE, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



CONVOLVULACEAE

Bonamia agrostopolis, CONVOLVULACEAE – **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado, borda de mata; **Distribuição:** BA, MG, RJ, PR, RS; **Local da foto:** BR 242 - Cristópolis – BA.



Ipomoea procumbens, CONVOLVULACEAE - Corda-de-violão - **Hábito:** Trepadeira herbácea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo limpo, campo rupestre (*stricto sensu*); **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, SP, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Ipomoea squamisepala, CONVOLVULACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** TO, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Cachoeira do Tororó - Brasília – DF.



Merremia tomentosa, CONVULVULACEAE - **Hábito:** Subarbusto ereto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado ralo, campo sujo, campo limpo, campo úmido; **Distribuição:** MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Jacquemontia linarioides, CONVULVULACEAE –
Hábito: Erva, subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado, campo; **Distribuição:** MG, GO; **Local da foto:**
Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Merremia cissoides, CONVOLVULACEAE – **Hábito:** Trepadeira herbácea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata, cerrado (*lato sensu*), campo rupestre (*lato sensu*), savanas amazônicas, área antrópica, daninha; **Distribuição:** AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, RN, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, RS; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Merremia flagellaris, CONVOLVULACEAE - **Hábito:** Trepadeira herbácea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PB, BA, GO, MG; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Merremia macrocalyx, CONVOLVULACEAE - Corda-de-viola, jatirana - **Hábito:** Trepadeira herbácea; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, cerrado (*lato sensu*), campo rupestre (*lato sensu*), savanas amazônicas, área antrópica, daninha; **Distribuição:** AP, PA, AM, TO, AC, MA, CE, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Merremia umbellata, CONVOLVULACEAE - **Hábito**:- Subarbusto ou trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat**: Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição**: AM, RO, MA, CE, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto**: Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



CYPERACEAE

Bulbostylis paradoxa, CYPERACEAE – **Hábito**:- Erva cespitosa perene; **Fitofisionomia ou Habitat**: Cerrado (*stricto sensu*), cerradão, vereda, campo sujo, campo rupestre (*lato sensu*), savanas amazônicas; **Distribuição**: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; **Local da foto**: Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Lagenocarpus rigidus, CYPERACEAE - Capim-arroz -
Hábito: Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerrado (*lato sensu*), campo úmido, brejo, campo rupestre; **Distribuição:** Em todo o Brasil; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO



DENNSTAEDTIACEAE

Pteridium aquilinum var. *arachnoideum*,
DENNSTAEDTIACEAE – **Hábito:** Samambaia das
Taperas; **Fitofisionomia ou Habitat:** Erva terrestre;
Borda de mata de galeria, Cerrado (*lato sensu*), campo
úmido, área antrópica, daninha; **Distribuição:** PA, AM,
CE, PE, BA, AL, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local
da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



DILLENiaceae

Curatella americana, DILLENiaceae - Lixeira -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), vereda, carrasco, savanas amazônicas; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG; **Local da foto:** Parque Nacional do Grande Sertão Veredas - Chapada Gaúcha - MG.



Davilla elliptica, DILLENIACEAE - Lixeirinha – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), vereda, campo sujo, campo limpo, campo com murundus; **Distribuição:** PA, TO, RO, MA, PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



DROSERACEAE

Drosera montana, DROSERACEAE - Orvalinha -
Hábito: Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Vereda, campo úmido, brejo, campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: PB, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Drosera communis, DROSERACEAE - Orvalinha -
Hábito: Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo limpo úmido, brejo, campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: BA, SE, MT, DF, MG, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



EBENACEAE

Diospyros hispida, EBENACEAE - Caqui do mato, Olho de Boi - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo; **Distribuição:** PA, TO, RO, MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



ERICACEAE

Agarista virgata, ERICACEAE - **Hábito:** Subarbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: MG; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



Gaylussacia brasiliensis, ERICACEAE - Camarinha
- **Hábito:** Arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado (*lato sensu*), vereda, brejo;
Distribuição: TO, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada Diamantina - Palmeiras - BA.



ERIOCAULACEAE

Actinocephalus polyanthus, ERIOCAULACEAE - Gravatá-do-campo - **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), campo rupestre (*lato sensu*), restinga; **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Paepalanthus giganteus, ERIOCAULACEAE -
Chuveirinho, Sombreiro - **Hábito:** Subarbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*stricto sensu*),
vereda, campo sujo, brejo, campo úmido, campo rupestre
(*stricto sensu*); **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, SP; **Local
da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros -
Alto Paraíso de Goiás - GO.



ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum citrifolium, ERYTHROXYLACEAE –
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** RO, AM, PA, AM, RR, MA, CE, PB, PE, BA, AL, MT, GO, MS, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Erythroxylum deciduum, ERYTHROXYLACEAE - Ata-de-cobra, baga-de-pomba, cocão - **Hábito:** Árvore ou arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, mata ciliar, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), vereda, campo com murundus, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** RO, MA, PI, CE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Erythroxylum suberosum, ERYTHROXYLACEAE
- Mercúrio-do-campo, cabelo-de-negro - **Hábito:**
Arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*),
verda, campo sujo, campo rupestre (*lato sensu*),
savanas amazônicas, carrasco; **Distribuição:** RO, AP,
PA, AM, TO, RR, MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, MT, GO,
DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Olhos
D'Água - Brasília - DF.



EUPHORBIACEAE

Euphorbia potentilloides (Sin: *Chamaesyce caecorum*),
EUPHORBIACEAE - **Hábito:** Erva, subarbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado, campo;
Distribuição: BA, MT, GO, MG, SP, PR, RS; **Local da foto:** ARIE Capetinga/Taquara - Brasília - DF.



Cnidoscolus quercifolius (Sin: *Cnidoscolus phyllacanthus*),
EUPHORBIACEAE - Favela-de-cachorro; **Hábito:**
árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto*
sensu); **Distribuição:** PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE, MG;
Local da foto: BR 242 - Cristópolis - BA.



Dalechampia caperonioides, EUPHORBIACEAE –
Hábito: Erva escandente; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo limpo úmido,
campo rupestre (*stricto sensu*); **Distribuição:** GO, DF,
SP; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Dalechampia linearis, EUPHORBIACEAE - **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo; **Distribuição:** PA, TO, PI, GO, RJ, SP, MG, ES; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Euphorbia sipolisii, EUPHORBIACEAE - **Hábito:** subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo rupestre; **Distribuição:** MG; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Diamantina - MG.



Manihot fruticulosa, EUPHORBIACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo; **Distribuição:** GO, MG; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Povoado São Jorge - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Manihot peltata, EUPHORBIACEAE - Maniçoba -
Hábito: Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo; **Distribuição:** GO;
Local da foto: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
- Povoado São Jorge - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Manihot quinqueloba, EUPHORBIACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MT, GO; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Povoado São Jorge - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Manihot salicifolia, EUPHORBIACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MT, GO, MS; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Povoado São Jorge - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Manihot violacea, EUPHORBIACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo úmido; **Distribuição:** MT, GO, MG; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



FABACEAE

Leptolobium dasycarpum (Sin: *Acosmium dasycarpum*),
FABACEAE - Cascudinho, unha-d'anta - **Hábito:** Árvore
ou arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata
de galeria, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo;
Distribuição: TO, RO, MA, PI, CE, BA, MT, GO, DF,
MS, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília
- Brasília - DF



Anadenanthera colubrina, FABACEAE - Angico -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria. Mata seca, cerrado; **Distribuição:** PI, CE, PB, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF



Andira antheimia, FABACEAE - Angelim - **Hábito:** Árvore ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, mata ciliar, cerrado (lato sensu); **Distribuição:** BA, AL, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Parque Nacional do Grande Sertão Veredas – Chapada Gaúcha - MG



Andira fraxinifolia, FABACEAE - Amargosa, Amargo, Pau-roxo - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, borda de mata de galeria, cerrado, cerrado (denso, típico), savanas amazônicas; **Distribuição:** PA, AM, TO, RO, MA, PI, CE, PB, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Cristalina - GO.



Andira vermifuga, FABACEAE - Angelim, mata-barata –
Hábito: Árvore, arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo limpo,
carrasco; **Distribuição:** AM, AC, MA, PI, CE, BA, MT,
DF, GO, MS, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de
Brasília - Brasília – DF.



Bauhinia curvula, FABACEAE - Pata-de-vaca, mororó
- **Hábito:** Arbusto ou Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** PA, MT, GO, MS, DF, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF



Bauhinia rufa, FABACEAE - Pata-de-vaca, mororó -
Hábito: Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, Campo rupestre (*lato sensu*) ; Nordeste, **Distribuição:** GO, DF, MG; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF



Bauhinia unguolata, FABACEAE - Mororó vermelho -
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado (*lato sensu*), transição com Amazônia;
Distribuição: RR, AM, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF



Calliandra dysantha, FABACEAE, Flor-do-cerrado
- **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado (*lato sensu*), Campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR;
Local da foto: Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF



Calliandra mucugeana, FABACEAE – **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: BA; **Local da foto:** Chapada Diamantina -
Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras - BA



Calliandra viscidula, FABACEAE - **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Chapada Diamantina - Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras - BA.



Camptosema isopetalum, FABACEAE – **Hábito:** Arbusto escandente; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, MG, ES, RJ; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF



Camptosema scarlatium, FABACEAE - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, Cerrado (*stricto sensu*), Campo rupestre (*stricto sensu*); **Distribuição:** CE, BA, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, RS; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF



Centrolobium tomentosum, FABACEAE - Araribá -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata seca, área antrópica; **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, RS, PR, SC; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Chamaecrista cathartica, FABACEAE – **Hábito:** Arbusto ou subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, vereda; **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, SP, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF



Chamaecrista cathartica var. *paucijuga*, FABACEAE –
Hábito: Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo
; **Distribuição:** MG; **Local da foto:** Parque Estadual do
Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG



Chamaecrista conferta, FABACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo limpo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** TO, PI, GO, DF, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Chamaecrista desvauxii var. *graminea*, FABACEAE
- **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, MG;
Local da foto: Chapada Imperial - Brazlândia - DF



Chamaecrista lundii, FABACEAE - **Hábito:** Arbusto ou subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo; **Distribuição:** BA, GO, DF, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Chamaecrista flexuosa, FABACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo; **Distribuição:** RR, PA, AM, TO, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF



Chamaecrista racemosa var. *lucida*, FABACEAE –
Hábito: Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** PA, TO, BA, MT,
GO, MS, MG; **Local da foto:** Parque Nacional Grande
Sertão Veredas - Chapada Gaúcha - MG



Chamaecrista rotundata, FABACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo rupestre (*lato sensu*), transição com mata atlântica; **Distribuição:** MG; **Local da foto:** Serra do espinhaço - Parque Estadual do Biribiri - Diamantina - MG.



Chamaecrista ursina, FABACEAE – **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Borda de mata de galeria, cerrado (*lato sensu*), campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: MG; **Local da foto:** Serra do espinhaço - Parque Estadual do Biribiri - Diamantina – MG.



Clitoria guianensis, FABACEAE – **Hábito:** Subarbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*lato sensu*), campo;
Distribuição: RR, AM, PA, AM, TO, MA, PI, CE, PE, BA,
MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, PR; **Local da foto:** Parque
Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis – GO.



Dalbergia miscolobium, FABACEAE - Jacarandá-do-cerrado, cabiúna - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*), carrasco; **Distribuição:** MA, PI, CE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque da Cidade - Brasília - DF.



Desmodium discolor, FABACEAE - **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerradão, Cerrado (*lato sensu*), vereda; **Distribuição:** AC, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR e todo o nordeste; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Dioclea grandiflora, FABACEAE – **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata seca; **Distribuição:** PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE; **Local da foto:** BR 242 - Cristópolis - BA



Dypterix alata, FABACEAE - Barú - **Hábito:** Árvore;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata de galeria, mata seca semidecídua, cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), área antropica; **Distribuição:** TO, MA, PI, CE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Formosa - GO.



Enterolobium gummiferum, FABACEAE - Rosquinha
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerradão, Cerrado (*stricto sensu*);
Distribuição: PA, MA, PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP;
Local da foto: Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Eriosema defoliatum, FABACEAE – **Hábito:** Subarbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*stricto sensu*),
campo sujo; **Distribuição:** GO, DF, MG; **Local da foto:**
Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Eriosema glaziovii, FABACEAE - **Hábito:** Erva;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*stricto sensu*),
campo sujo; **Distribuição:** GO, DF; **Local da foto:**
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso
de Goiás - GO.



Eriosema stenophyllum, FABACEAE - **Hábito:** Erva;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*lato sensu*);
Distribuição: GO, DF, MG; **Local da foto:** Cristalina - GO.



Erythrina speciosa, FABACEAE - Mulungu, canivete, suinã - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata seca, área antrópica; **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** ARIE do Bosque - Brasília - DF.



Erythrina verna, FABACEAE, Mulungu, canivete, suinã –
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata seca, cerrado, cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** TO, AC, MA, BA, MT, GO, DF, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Campus UnB - Brasília - DF.



Galactia peduncularis, FABACEAE - **Hábito:** Erva;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*lato sensu*);
Distribuição: GO, DF, MG; **Local da foto:** Parque Olhos
D'Água - Brasília - DF.



Harpalyce brasiliana, FABACEAE - **Hábito**:- Arboreta ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat**: Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição**: PA, TO, MA, PI, CE, PB, BA, MT, GO, MG; **Local da foto**: Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Hymenaea courbaril, FABACEAE - Jatobá, jatobá-da-mata - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria; **Distribuição:** PA, AM, MA, PI, CE, PB, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Hymenaea stigonocarpa, FABACEAE - jatobá-do-cerrado - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** PA, MA, CE, BA, MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Inga laurina, FABACEAE - Ingá-branco - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria; **Distribuição:** PA, AM, AC, MA, CE, PB, PE, BA, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Parque da Cidade - Brasília - DF.



Lupinus velutinus, FABACEAE - **Hábito:** Subarbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata de galeria, Cerrado (*lato sensu*), campo sujo, campo limpo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, RJ; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Macroptilium atropurpureum, FABACEAE - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Macroptilium erythroloma, FABACEAE - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Mimosa caesalpiniiifolia, FABACEAE - Sabiá, sansão-do-campo, unha-de-gato – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** MA, PE, PI; **Local da foto:** Parque da Cidade - Brasília – DF.



Mimosa clausenii, FABACEAE - Mimosa - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo; **Distribuição:** GO, DF, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Mimosa hebecarpa, FABACEAE - Angiquinho - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), mata seca (de encosta); **Distribuição:** MT, GO, MS; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Mimosa nuda, FABACEAE - Dorme-dorme - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Cachoeira do Tororó - Brasília - DF.



Mimosa regina, FABACEAE - **Hábito:** Árvore;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*lato sensu*), campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** GO; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Mimosa sensitiva, FABACEAE - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), campo rupestre (*lato sensu*), área antrópica; **Distribuição:** PA, AM, MA, PI, CE, PE, BA, MS, MG ; **Local da foto:** BR 242 - Queimada Nova - BA.



Parkia platycephala, FABACEAE - Faveira, Fava-de-bolota
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata seca semidecídua, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), savanas amazônicas; **Distribuição:** PA, TO, MA, PI, CE, BA, GO; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Peltophorum dubium, FABACEAE - Canafistula -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata
seca semidecídua, área antrópica, transição com mata
atlântica, cultivada; **Distribuição:** PB, PE, BA, SE,
DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Parque
Ecológico Dom Bosco - Brasília - DF.



Piptadenia gonoacantha, FABACEAE - Pau-jacaré -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galera, mata seca decídua; **Distribuição:** RN, PB, PE, BA, AL, SE, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Pterodon pubescens, FABACEAE - Sucupira-branca -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado (*stricto sensu*), carrasco; **Distribuição:** TO, MA, PI, MT, GO, DF, MS, MG; **Local da foto:** Parque da Cidade - Brasília - DF.



Tachigali aurea (Sin: *Sclerolobium aureum*), FABACEAE
- Carvoeiro, tatarena – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia**
ou Habitat: Mata de galeria, cerrado (*lato sensu*);
Distribuição: TO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da**
foto: Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Senna macranthera, FABACEAE - Fedegoso, Pau-de-besouro - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado (*lato sensu*), caatinga; **Distribuição:** TO, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Senna pendula var. *glabrata*, FABACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerradão, cerrado (*lato sensu*), vereda ; **Distribuição:** PA, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



Senna rugosa, FABACEAE – **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata de galeria, cerrado (*lato sensu*), vereda, campo sujo, campo limpo, carrasco;
Distribuição: PA, TO, RO, MA, PI, CE, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Campus da Universidade de Brasília (UnB) – Brasília -DF.



Stryphnodendron adstringens, FABACEAE - Barbatimão
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** TO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Stylosanthes scabra, FABACEAE - Alfafa-do-nordeste
- **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado (*lato sensu*), campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: RR, PA, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL,
MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Campus
da Universidade de Brasília (UnB) - Brasília - DF.



Stylosanthes viscosa, FABACEAE - Meladinha - **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** RR, AM, PA, AM, AC, RO, MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Parque da Cidade - Brasília - DF.



GENTIANACEAE

Calolisianthus speciosus (Sin: *Irlbachia speciosa*),
GENTIANACEAE - **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), campo sujo, campo limpo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** TO, BA, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Calolisianthus pedunculatus (Sin: *Irlbachia pedunculata*), GENTIANACEAE – **Hábito:** Erva perene; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo úmido, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, GO, MG, SP, PR, SC; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina – MG.



Paliavana tenuiflora, GENTIANACEAE - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PB, PE, BA, MG e ES; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada Diamantina - Palmeiras - BA.



Deianira erubescens, GENTIANACEAE – **Hábito:** Erva;
Fitofisionomia ou Habitat: Borda de mata de galeria,
cerrado (*stricto sensu*), campo sujo; **Distribuição:** GO,
MG, SP; **Local da foto:** Pirenópolis - GO – Brasil.



Deianira nervosa, GENTIANACEAE – **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerrado (stricto sensu), campo sujo, campo limpo; **Distribuição:** MA, BA, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF



Deianira pallescens, GENTIANACEAE - Boca-se-sapo
- **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo limpo;
Distribuição: MT, GO, MG, SP; **Local da foto:** Jardim
Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Chelonanthus viridiflorus (Sin.: *Irlbachia alata*),
GENTIANACEAE - Genciana-da-terra - **Hábito:**
Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata
de galeria, cerrado (ralo, rupestre), vereda, campo sujo,
campo limpo, brejo, campo rupestre (*lato sensu*), savanas
amazônicas; **Distribuição:** RR; **Local da foto:** Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Schultesia pachyphylla, GENTIANACEAE - **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo úmido, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras - BA.



Voyria aphylla, GENTIANACEAE - **Hábito:** Erva saprófita; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata, transição com mata atlântica e com Amazônia; **Distribuição:** RR, AM, PA, AP, PE, BA, MT, MG, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Estação Ecológica do IBGE - Brasília - DF.



HUMIRIACEAE

Humiria balsamifera, HUMIRIACEAE - Umiri-bálsamo
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Savanas amazônicas; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, MA, PE, BA, MT, GO, MG, RJ; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



HYPERICACEAE

Vismia pentagyna (Sin: *Vismia decipiens*),
HYPERICACEAE - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia**
ou Habitat: Cerrado, Capoeira; **Distribuição:** BA,
GO; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros - Cavalcante - GO.



IRIDACEAE

Cipura xanthomelas (Sin: *Cipura flava*), IRIDACEAE
- **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Úmido, Savanas Amazônicas; **Distribuição:** MA, BA, MT, GO, DF, MS, MG; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Trimezia juncifolia, IRIDACEAE - Ruibarbo-do-campo
- **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), vereda, campo sujo, campo limpo, brejo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Trimezia violacea, IRIDACEAE - **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo Rupestre (*lato sensu*), Brejo; **Distribuição:** BA, GO, MG; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



LAMIACEAE

Aegiphila verticillata (Sin: *Aegiphila lhotzkiana*),
LAMIACEAE - Milho-de-grilo, fruta-de-papagaio,
corticeira - **Hábito:** Arvoreta ou arbusto; **Fitofisionomia
ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, cerrado (*lato
sensu*); **Distribuição:** AM, PA, AM, TO, RO, MA, CE,
PB, PE, BA, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC;
Local da foto: Parque Olhos D' Água - Brasília - DF.



Amasonia campestris, LAMIACEAE – **Hábito:** Subarbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata Seca, Mata de Galeria,
Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Savanas amazônicas;
Distribuição: PA, AM, AC, MA, PI, CE, BA, MG, GO, ES;
Local da foto: Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Hypenia macrantha, LAMIACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo Limpo, Savanas amazônicas; **Distribuição:** MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Hyptis cruciformis, LAMIACEAE – **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Campo Limpo Úmido,
Brejo; **Distribuição:** GO; **Local da foto:** Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás – GO.



Hyptis imbricatiformis, LAMIACEAE – **Hábito:** Arbusto ereto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** GO; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO. **Espécie Ameaçada de Extinção (IN MMA 06/2008).**



LAURACEAE

Nectandra cissiflora (Sin: *Nectandra myriantha*),
LAURACEAE - Canela fedida - **Hábito:** Árvore;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata de Galeria, Mata Seca
Semidecídua; **Distribuição:** PA, AC, PE, BA, MT, GO,
DF, MS, MG, SP, PR, RS; **Local da foto:** Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Ocotea spixiana, LAURACEAE - Canelão, canela-do-cerrado - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** Nordeste, GO, DF, MS, MG, ES; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



LECYTHIDACEAE

Cariniana rubra, LECYTHIDACEAE - Cachimbeira, cachimbo de macaco, jequitibá - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca, Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, TO, MT, GO, Sudeste; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



LOGANIACEAE

Antonia ovata, LOGANIACEAE - Quina - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Savanas amazônicas, Carrasco; **Distribuição:** RR, PA, AM, RO, BA, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Parque Ecológico Dom Bosco - Brasília - DF.



Spigelia pulchella, LOGANIACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mato Seca (de encosta), Cerrado (*lato sensu*), Campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras – BA.



Spigelia spartioides, LOGANIACEAE – **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), Campo Rupreste (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, MG; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



LORANTHACEAE

Passovia ovata (Sin: *Phthirusa ovata*), LORANTHACEAE
- **Hábito:** Hemiparasita; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca, Mata Ciliar, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** AP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Psittacanthus cinctus, LORANTHACEAE – **Hábito:** Hemiparasita; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata, Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, AM, RO, BA, GO ; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante – GO.



Psittacanthus robustus, LORANTHACEAE – **Hábito:** Hemiparasita; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** AP, PA, AM, MA, BA, SE, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Cachoeira do Tororó - Brasília - DF



LYCOPODIACEAE

Huperzia mooreana, LYCOPODIACEAE – **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo rupestre; **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Chapada Diamantina - Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras – BA.



LYTHRACEAE

Cuphea arenarioides, LYTHRACEAE - **Hábito:** Erva;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*lato sensu*);
Distribuição: SP; **Local da foto:** Parque Nacional do
Grande Sertão Veredas - Chapada Gaúcha - MG.



Cuphea linarioides, LYTHRACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerrado (*stricto sensu*), Campo rupreste (*lato sensu*); **Distribuição:** GO, DF, MS, MG, SP, PR, SC, RS; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Cuphea micrantha, LYTHRACEAE – **Hábito:** Erva;
Fitofisionomia ou Habitat: Borda de Mata, Cerrado
(*stricto sensu*), área antrópica; **Distribuição:** TO, MA,
PI, BA, SE, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:**
Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Cuphea spermacoce, LYTHRACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Campo sujo, Campo Limpo, Campo Úmido, Campo Rupestre (*lato sujo*); **Distribuição:** GO, DF; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Cuphea xanthopetala, LYTHRACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** MT; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Povoado São Jorge - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Diplusodon microphyllus, LYTHRACEAE - **Hábito:** subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado, campo cerrado; **Distribuição:** MG, GO; **Local da foto:** Quilombo Kalunga - Cavalcante - GO.



Diplusodon sessiliflorus, LYTHRACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** GO, DF; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO



Diplusodon villosissimus, LYTHRACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado Rupestre, Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sujo*); **Distribuição:** MG, SP; **Local da foto:** Quilombo Kalunga - Cavalcante - GO.



Diplusodon virgatus, LYTHRACEAE – **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Borda de Mata de Galeria,
Cerradão, Cerrado, (*stricto sensu*), vereda, carrasco;
Distribuição: TO, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Povoado São Jorge - Alto Paraíso de Goiás – GO.



Physocalymma scaberrimum, LYTHRACEAE - Cegamachado, quebra-facão - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Seca Semidecídua, Cerrado (*stricto sensu*), Savanas amazônicas; **Distribuição:** PA, TO, AC, MT, GO, DF; **Local da foto:** RPPN Fazenda Vaga-Fogo - Pirenópolis - GO.



MALPIGHIACEAE

Banisteriopsis anisandra, MALPIGHIACEAE - Cipó-prata – **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água – Brasília – DF.



Banisteriopsis campestris, MALPIGHIACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*sensu stricto*), Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sensu*), Carrasco; **Distribuição:** MA, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília – DF.



Banisteriopsis gardneriana, MALPIGHIACEAE
- Cipó-prata, crista-de-galo - **Hábito:** trepadeira;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata de Galeria, Cerrado
(*lato sensu*), Campo (seco); **Distribuição:** MA, PI, BA,
MG, GO, DF, MS, MG; **Local da foto:** Parque Nacional do
Grande Sertão Veredas - Chapada Gaúcha - MG.



Banisteriopsis oxyclada, MALPIGHIACEAE – **Hábito:** trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria; **Distribuição:** PA, MA, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água – Brasília - DF.



Byrsonima basiloba, MALPIGHIACEAE - Murici -
Hábito: subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo Limpo,
Campo com Murundus, Campo Rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:**
Parque Olhos D'Água - Brasília- DF.



Byrsonima coccolobifolia, MALPIGHIACEAE - Murici-rosa - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** RR, AM, TO, BA, SE, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Byrsonima guilleminiana, MALPIGHIACEAE - Muricirasteiro - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Campo Sujo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO



Byrsonima intermedia, MALPIGHIACEAE - Murici
- **Hábito:** Árvore ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Vereda, Campo Sujo, Campo Rupestre (*lato sensu*), Invasora; **Distribuição:** MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Cachoeira do Tororó - Brasília - DF



Byrsonima laxiflora, MALPIGHIACEAE - Murici-da-mata - **Hábito:** árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Campo úmido; **Distribuição:** GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Byrsonima linearifolia, MALPIGHIACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), Campo úmido; **Distribuição:** MG, GO; **Local da foto:** Cristalina – GO.



Byrsonima pachyphylla, MALPIGHIACEAE - Murici-vermelho - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata, Campo Sujo; **Distribuição:** PA, TO, RO, MA, RN, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Byrsonima verbascifolia, MALPIGHIACEAE - Murici -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de
Galeria, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo
com Murundus, Campo Rupestre (*lato sensu*), Savanas
amazônicas; **Distribuição:** RO, BA, AL, MT, GO, DF, MS,
MG, SP, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília -
Brasília - DF.



Camarea ericoides, MALPIGHIACEAE - **Hábito:** Subarbusto ereto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado ralo, Campo Sujo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus – Pirenópolis – GO.



Pterandra pyroidea, MALPIGHIACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Sujo; **Distribuição:** MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Estadual Terra Ronca – São Domingos – GO.



Stigmaphyllon paralias, MALPIGHIACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, GO, ES, RJ; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada Diamantina – Palmeiras – BA.



Tetrapteris microphylla, MALPIGHIACEAE - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata, Cerrado (*lato sensu*), Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** TO, BA, GO, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros – Cavalcante – GO.



MALVACEAE

Cavanillesia umbellata (Sin: *Cavanillesia arborea*),
MALVACEAE - Barriguda - **Hábito:** Árvore;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata Seca (Decídua),
Ambiente rupestre, Transição com a Caatinga;
Distribuição: TO, AC, PI, BA, MG; **Local da foto:**
Reserva Extrativista do Recanto das Araras de Terra Ronca
- São Domingos - GO.



Corchorus hirtus, MALVACEAE - **Hábito:** Erva, subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Borda de Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Capoeira; **Distribuição:** PA, AM, MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Eriotheca pubescens, MALVACEAE - Paineira-do-cerrado - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*lato sensu*), Campo; **Distribuição:** TO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Guazuma ulmifolia, MALVACEAE - Mutamba - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão, Capoeira; **Distribuição:** PA, AC, RO, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Estadual Terra Ronca - São Domingos - GO.



Helicteres brevispira, MALVACEAE - Saca-rolha -
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de
Galeria, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Rupestre (*lato
sensu*), Capoeira; **Distribuição:** PA, TO, RO, MA, PI, PE,
BA, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:**
Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Helicteres sacarolha, MALVACEAE - Saca-rolha -
Hábito: Subcarnusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Mata Ciliar, Borda de Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado
(*stricto sensu*), Campo Sujo, Capoeira; **Distribuição:** PA,
TO, RO, MA, BA, MT, DF, GO, MS, MG, SP; **Local da
foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



MS

Luehea divaricata, MALVACEAE - Açõita-cavalo – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão, Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, SP, RJ, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília – DF.



Luehea paniculata, MALVACEAE, Açoita-cavalo-amarelo – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão; **Distribuição:** AM, MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, SC, RS; **Local da foto:** RPPN Fazenda Vaga Fogo – Pirenópolis – GO.



Pavonia grandiflora, MALVACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Savanas amazônicas; **Distribuição:** RO, DF; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília- DF.



Pavonia luetzelburgii, MALVACEAE – **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*lato sensu*),
Campo Rupestre (*lato sensu*), Carrasco; **Distribuição:**
BA; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do
Pai Inácio – Palmeiras – BA.



Pavonia rosa-campestris, MALVACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Sujo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** RO, BA, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Peltaea polymorpha, MALVACEAE – **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MT, GO, MS, MG, SP, SC, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Pseudobombax longiflorum, MALVACEAE -
Embirçu, Imbirçu; Mamonarana - **Hábito:** Árvore;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata de Galeria, Mata
Seca (Decídua), Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*);
Distribuição: BA, MT, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC,
RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Pseudobombax tomentosum, MALVACEAE - Embiruçu-peludo - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Mata Seca (Decídua), Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MS, SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Sida linifolia, MALVACEAE - Malva, guanxuma -
Hábito: Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado
(*stricto sensu*), Campo Sujo, Capoeira; **Distribuição:** RO,
PI, RN, PB, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ; **Local
da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Sterculia striata, MALVACEAE - Chichá - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata Seca Semidecídua; **Distribuição:** PA, TO, MA, PI, CE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Waltheria americana, MALVACEAE - Malva-branca, malva-veludo - **Hábito:** Erva, subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (stricto sensu), Campo Sujo, Capoeira; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Barreiras - BA.



MARANTACEAE

Maranta leuconeura, MARANTACEAE – **Hábito:** Erva, subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Borda de Mata de Galeria; **Distribuição:** CE, BA, MS, MG, ES, RJ; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF



MARCGRAVIACEAE

Norantea guianensis, MARCGRAVIACEAE – **Hábito**:-
Árvore ou liana; **Fitofisionomia ou Habitat**: Mata Ciliar,
Mata de Galeria, Cerrado Rupestre, Campo rupestre (*lato
sensu*); **Distribuição**: RO, AM, PA, AP, TO, AC, RR, MA,
RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP,
RJ, PR, SC, RS; **Local da foto**: Reserva Biológica da Serra
Dourada – Mossâmedes – GO.



Schwartzia adamantium (Sin: *Norantea adamantium*),
MARGRAVIACEAE - Mel-de-arara – **Hábito:** Árvore;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** BA, GO, DF, MG; **Local da foto:**
Parque Estadual Serra dos Pirineus – Pirenópolis – GO.



MAYACACEAE

Mayaca fluviatilis, MAYACACEAE - Lodo - **Hábito:** Erva aquática ou terrestre; **Fitofisionomia ou Habitat:** Beira de vazantes e lagoas, veredas; **Distribuição:** AP, AM, AC, RO, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional Grande Sertão Veredas – Chapada Gaúcha – MG.



MELASTOMATACEAE

Cambessedesia espora, MELASTOMATACEAE –
Hábito: Erva ereta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo; **Distribuição:** GO, DF, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água – Brasília – DF.



Cambessedesia hilariana, MELASTOMATACEAE
- **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: TO, PE, PI, BA, GO, DF, MG, ES, RJ, PR;
Local da foto: Parque Estadual de Terra Ronca – São Domingos – GO.



Chaetostoma selagineum, MELASTOMATACEAE
- **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo Limpo; **Distribuição:** GO; **Local da foto:** Cristalina – GO.



Clidemia hirta, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Savanas amazônicas; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, AC, RO, MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Jardim Zoológico de Brasília - Brasília – DF.



Clidemia octona, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca Semidecídua; **Distribuição:** RR, PA, AC, RO, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás – GO.



Desmocelis villosa, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), Vereda, Campo Úmido, Brejo, Savanas amazônicas; **Distribuição:** RR, PA, AM, AC, RO, PI, BA, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Parque Nacional Grande Sertão Veredas – Chapada Gaúcha – MG.



MS



Lavoisiera fragilis, MELASTOMATACEAE - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo, campo úmido; **Distribuição:** GO; **Local da Foto:** Parque Estadual Serra dos Pireneus - Pirenópolis - GO.



Lavoisiera grandiflora, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Vereda, Campo Úmido, Brejo; **Distribuição:** GO, DF, MG; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia – DF.



Lavoisiera phyllocalycina, MELASTOMATACEAE
- **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado, vereda; **Distribuição:** PR, SP, MG, GO, DF;
Local da foto: Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Macairea radula, MELASTOMATACEAE - **Hábito:** Arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata Ciliar, Borda de Mata de Galeria, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sensu*), Brejo; **Distribuição:** PA, AM, TO, RO, MA, PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Marcetia harleyi, MELASTOMATACEAE - **Hábito:** Subarbusto cespitoso; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada Diamantina – Palmeiras – BA.



Marquetia taxifolia, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Arbusto ereto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), Campo Sujo, Campo Úmido, Campo Rupestre (*lato sensu*), Savanas amazônicas; **Distribuição:** RR, CE, PB, PE, BA, AL, SE, DF, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Nacional Grande Sertão Veredas – Chapada Gaúcha – MG.



Marcetia velutina, MELASTOMATACEAE - **Hábito:** Arbusto ereto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo Rupestre (*lato sensu*), transição com a Caatinga; **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada Diamantina - Palmeiras - BA.



Miconia chamissois, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Vereda, Campo Úmido, Brejo; **Distribuição:** TO, MA, CE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília – DF.



Miconia albicans, MELASTOMATACEAE - Folha-branca - **Hábito:** Arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Sujo (com murundus), Savanas amazônicas, Carrasco; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Miconia burchellii. MELASTOMATACEAE - Pixirica –
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de
Mata de Galeria, Mata Seca, cerradão, Cerrado (*stricto
sensu*); **Distribuição:** PA, TO, GO, DF, MG; **Local da
foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Miconia ciliata, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Campo Rupestre (*lato sensu*), Savanas Amazônicas; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, ES; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás – GO.



Miconia cuspidata, MELASTOMATACEAE - Pixirica
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão, Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** AP, AM, PA, AC, PE, MT, DF, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Miconia elegans, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Vereda, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, TO, BA, SE, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás – GO.



Miconia fallax, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Sujo (Úmido), Campo Limpo, Campo com Murundus, Campo Rupestre (*lato sensu*), Brejo; **Distribuição:** RR, PA, RO, MA, PI, PB, BA, SE, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Miconia ferruginata, MELASTOMATACEAE - Pixirica –
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, TO, SE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Miconia macrothyrsa, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Seca, Cerradão, Cerrado (*lato sensu*), Campo; **Distribuição:** RR, PA, TO, MA, BA, MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus – Pirenópolis – GO.



Miconia pepericarpa, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Árvore ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria, Cerrado Rupestre, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Miconia rubiginosa, MELASTOMATACEAE -
Quaresmeira-branca - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia
ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda,
Campo Rupestre (*lato sensu*), Savanas amazônicas;
Distribuição: RR, PA, AM, TO, RO, PI, PE, BA, MT, GO,
DF, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília -
Brasília - DF.



Miconia stenostachya, MELASTOMATACEAE - Pixirica
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** AM, BA, DF, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Microlicia euphorbioides, MELASTOMATACEAE –
Hábito: Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Vereda, Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sensu*), Brejo; **Distribuição:** Todo Nordeste, MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás – GO.



Microlicia fasciculata, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Subarbusto ereto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Vereda, Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sensu*), Brejo; **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante – GO.



Microlicia fulva, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Subarbusto ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria (*lato sensu*), Vereda, Campo Úmido, Brejo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, GO, DF, MG; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante – GO.



Microlicia viminalis (Sin: *Microlicia loricata*),
MELASTOMATACEAE - **Hábito:** Subarbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Vereda, Campo Limpo,
Campo Úmido, Brejo, Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:**
BA, GO, DF, MG; **Local da foto:** Cristalina - GO.



Microlicia myrtoidea, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** SP, PR; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia – DF.



Microlicia warmingiana, MELASTOMATACEAE –
Hábito: Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Campo Rupestre; **Distribuição:** MG; **Local da foto:**
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso
de Goiás – GO.



Mouriri apiranga, MELASTOMATACEAE - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Seca; **Distribuição:** PA, AM, AC, RO, MT; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Mouriri elliptica, MELASTOMATACEAE - Croadinha, coroa-de-frade - **Hábito:** Arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado Típico; **Distribuição:** TO, MA, PI, BA, MT, GO, MS; **Local da foto:** Parque Nacional do Grande Sertão Veredas - Chapada Gaúcha - MG.



Mouriri pusa, MELASTOMATACEAE - Puçá - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado Típico; **Distribuição:** PA, TO, RO, MA, PI, CE, BA, SE, MT, GO, MS, MG; **Local da foto:** Parque Estadual de Terra Ronca - São Domingos - GO.



Pterolepis glomerata, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), vereda, campo úmido, campo rupestre (*lato sensu*), savanas amazônicas; **Distribuição:** RO, PA, MA, PI, CE, RN, PE, BA, GO, MG, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



Pterolepis perpusilla, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, Cerrado (*lato sensu*), campo úmido; **Distribuição:** SE, MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Pterolepis repanda, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), vereda, campo sujo, campo limpo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



Rhinchanthera grandiflora, MELASTOMATACEAE –
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado (*lato sensu*), vereda, campo úmido, brejo, savanas amazônicas; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, RR, MA, PI, CE, PE, BA, AL, MT, DF, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Siphanthera foliosa, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Vereda, campo limpo; **Distribuição:** AM, RO, MT, GO, MG; **Local da foto:** Parque Nacional Grande Sertão Veredas – Chapada Gaúcha – MG.



Stenodon gracilis, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo úmido, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** GO; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Povoado São Jorge - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Stenodon suberosus, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo úmido, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** GO, DF; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Tibouchina aegopogon, MELASTOMATACEAE –
Hábito: Subarbusto ereto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado ralo, campo sujo, campo limpo, campo úmido;
Distribuição: TO, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:**
Cachoeira do Tororó - Brasília - DF.



Tibouchina candolleana, MELASTOMATACEAE
- Quaresmeira - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia**
ou Habitat: Mata ciliar, mata de galeria, vereda;
Distribuição: GO, DF, MG; Parque Estadual do Biribiri;
Local da foto: Parque Nacional da Chapada Diamantina
- Palmeiras - BA.



Tibouchina heteromalla, MELASTOMATACEAE –
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, transição com mata atlântica, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PB, PE, GO, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Diamantina – MG.



Tibouchina papyrus, MELASTOMATACEAE –
Hábito: Arvoreta ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado rupestre, campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: GO; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis – GO.



Tibouchina pereirae, MELASTOMATACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras – BA.



Tibouchina stenocarpa, MELASTOMATACEAE –
Hábito: Arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, RO, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília – DF.



Toca guianensis, MELASTOMATACEAE - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), transição com Amazônia, vereda, borda de mata de galeria; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, AC, RO, MA, PE, BA, GO, DF, MS, MG; **Local da foto:** APA do Rio Descoberto - Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Trembleya neopyrenaica, MELASTOMATACEAE –
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado rupestre, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** GO; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Trembleya parviflora, MELASTOMATACEAE - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Trembleya phlogiformis, MELASTOMATACEAE –
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, cerrado (*lato sensu*), vereda, campo sujo, brejo; **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis – GO.



Cabralea canjerana, MELIACEAE - Cedrobravo - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca (Semidecídua, Decídua), Cerradão; **Distribuição:** RR, PA, AC, BA, MT, GO, DF, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional do Grande Sertão Veredas - Chapada Gaúcha - MG.



Guarea guidonia, MELIACEAE - Carrapeta, marinhoiro
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria; **Distribuição:** RR, PA, AM, AC, RO, MA, CE, BA, MT, GO, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



MORACEAE

Brosimum gaudichaudii, MORACEAE - Mama-cadela
- **Hábito:** Arbusto ou árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo;
Distribuição: AM, RO, MA, CE, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



MYRISTICACEAE

Virola sebifera, MYRISTICACEAE - Bicuiba-preta, ucuúba-preta - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca Semidecídua, Cerradão, Cerrado (*lato sensu*), Savanas amazônicas; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, MT, GO, DF, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



MYRSINACEAE

Myrsine gardneriana, MYRSINACEAE - Capororoca -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de
Galeria, Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, DF, MG,
ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional de
Brasília - Brasília - DF.



Myrsine guianensis, MYRSINACEAE - Capororoca -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca, Cerrado (*lato sensu*), Vereda, Campo com Murundus, Campo Rupestre (*lato sensu*), Savanas amazônicas; **Distribuição:** AP, PA, AM, BA, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



MYRTACEAE

Eugenia calycina, MYRTACEAE - **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*stricto sensu*),
Vereda, Campo com Murunduns; **Distribuição:** GO, SP, PR;
Local da foto: Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



MS



Eugenia dysenterica, MYRTACEAE - Cagaiteira -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Carrasco;
Distribuição: MA, PI, CE, MT, GO, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Psidium grandifolium (Sin: *Psidium cinereum*),
MYRTACEAE - **HÁBITO**: Subarbusto; **Fitofisionomia
ou Habitat**: Cerrado (stricto sensu), Campo Sujo;
Distribuição: BA, GO, MG, ES, SP, PR, SC; **Local da foto**:
Parque Nacional do Grande Sertão Veredas - Chapada
Gaúcha - MG.



Eugenia puniceifolia, MYRTACEAE – **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata Seca Semidecídua, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo Limpo, Campo com Murunduns, Campo Rupestre;
Distribuição: RR, AP, PA, AM, TO, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR;
Local da foto: Reserva Extrativista do Recanto das Araras de Terra Ronca - São Domingos – GO.



Pimenta pseudocaryophyllus, MYRTACEAE - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Psidium salutare var. *pohlianum*, MYRTACEAE – **Hábito:** Arbusto ou arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo; **Distribuição:** PA, BA, MT, GO, MG, SP, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Eugenia bimarginata, MYRTACEAE – **Hábito:** Árvore;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata Ciliar, Mata de Galeria,
Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** BA, MT,
GO, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Cristalina – GO.



Myrcia splendens (Sin: *Myrcia rostrata*), MYRTACEAE
- Guamirim-folha-miúda - **Hábito:** Árvore;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão, Cerrado (*lato sensu*), Vereda, Campo com Murunduns, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** Todo o Brasil extra-amazônico; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Eugenia klotzschiana, MYRTACEAE - Pêra-do-cerrado
- **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado (*stricto sensu*), Campo; **Distribuição:** BA, GO,
MS, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília
- Brasília - DF.



Blepharocalyx salicifolius, MYRTACEAE - Maria-preta
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, MT, GO, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



NYCTAGINACEAE

Guapira graciliflora, NYCTAGINACEAE - Maria-mole -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*lato sensu*), Vereda, Carrasco;
Distribuição: RO, MA, PI, CE, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Guapira noxia, NYCTAGINACEAE - Caparrosa – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante – GO.



ONAGRACEAE

Ludwigia tomentosa, ONAGRACEAE - Cruz-de-malta
- **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata Ciliar, Cerrado (*lato sensu*), Brejo, Ambiente aquático; **Distribuição:** TO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



OCHNACEAE

Sauvagesia erecta, OCHNACEAE – **Hábito:** Erva ou subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Campo Sujo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** Todo Brasil; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília – DF.



Sauvagesia oliveirae, OCHNACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo Sujo, Campo Rupestre; **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada Diamantina - Palmeiras - BA.



Ouratea confertiflora, OCHNACEAE – **Hábito:** Arbusto ou subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo; **Distribuição:** MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Ouratea hexasperma, OCHNACEAE - Barba de bode, vassoura de bruxa - **Hábito:** Arvoreta ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo com Murunduns, Savanas amazônicas, Carrasco; **Distribuição:** AP, TO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



ORCHIDACEAE

Polystachia micrantha, ORCHIDACEAE – **Hábito:** Erva epífita; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Seca Semidecídua; **Distribuição:** BA, SP, RS; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras – BA.



Enciclia alboxanthina, ORCHIDACEAE – **Hábito**:- Erva epífita; **Fitofisionomia ou Habitat**: Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição**: BA; **Local da foto**: Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras – BA.



Epidendrum cristatum, ORCHIDACEAE – **Hábito:** Erva epífita; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras - BA.



Zygopetalum sincoranum, ORCHIDACEAE – **Hábito:** Erva epífita ou rupícola; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada Diamantina - Palmeiras – BA.



Cattleya elongata, ORCHIDACEAE - **Hábito:** Erva epífita ou rupícola; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PE, BA, MG; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras - BA.



Acianthera ochreatea, ORCHIDACEAE – **Hábito:** Erva rupícola; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PB, PE, BA, MG; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras – BA.



Epistephium lucidum, ORCHIDACEAE – **Hábito:** Erva epífita; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria Inundável, Campo Úmido, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** RR, TO, BA, GO, DF, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras – BA.



Cyrtopodium eugenii, ORCHIDACEAE - **Hábito:** Erva terrestre; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo Rupestre (*stricto sensu*); **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás - GO.



Epidendrum secundum, ORCHIDACEAE - **Hábito:** Erva epífita ou terrestre; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca Semidecídua, Campo Úmido, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, CE, PE, BA, MT, GO, DF, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Bulbophyllum rupicolum, ORCHIDACEAE - **Hábito:** Erva rupícola; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** GO, MG, SP; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Habenaria hamata, ORCHIDACEAE – **Hábito:** Erva terrestre; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*lato sensu*), Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** AP, PA, TO, PI, PB, PE, BA, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Eulophia alta, ORCHIDACEAE – **Hábito:** Erva terrestre;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*lato sensu*), Campo Sujo, Área antrópica; **Distribuição:** AP, PA, AM, TO, RO, MA, BA, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Epistephium sclerophyllum, ORCHIDACEAE –
Hábito: Erva terrestre; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo Limpo;
Distribuição: PA, AM, TO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante – GO.



OROBANCHACEAE

Buchnera juncea, OROBANCHACEAE – **Hábito:** Erva ereta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Vereda, campo limpo úmido, brejo, campo rupestre (lato sensu), Savanas Amazônicas; **Distribuição:** RO, AM, PA, AM, AC, MA, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília – DF.



Physocalyx major, OROBANCHACEAE - **Hábito:** Arbusto, subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado, cerrado rupestre; **Distribuição:** MG; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



Esterhazyia nanuzae, OROBANCHACEAE - **Hábito:** Arbusto, subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado, Cerrado Rupestre; **Distribuição:** MG; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



Esterhazyia macrodonta, OROBANCHACEAE - Imbiri -
Hábito: Arbusto, subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Vereda, campo úmido, borda de mata de galeria, cerrado
rupestre; **Distribuição:** BA, GO, DF, MG, SP, RJ, PR; **Local
da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



OXALIDACEAE

Oxalis hirsutissima, OXALIDACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, TO, MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Estadual do Rio Preto - São Gonçalo do Rio Preto - MG.



MS

Oxalis densifolia, OXALIDACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado(*lato sensu*), Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Úmido, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MT, GO, DF, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



PASSIFLORACEAE

Passiflora nitida, PASSIFLORACEAE - Maracujá-de-cheiro - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Campo com Murundus; **Distribuição:** PA, AM, AC, RO, BA, MT, GO, DF; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Passiflora edmundoi, PASSIFLORACEAE - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado; **Distribuição:** BA, MG, ES; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Palmeiras - BA.



Passiflora cerradense, PASSIFLORACEAE - Maracujá-do-cerrado - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão; **Distribuição:** MT, GO, DF; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



PERACEAE

Pera glabrata, PERACEAE - Sapateiro, sete casca, tamanqueira - **Hábito:** Arvore ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, cerradão, cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** AM, PA, AP, AC, RO, MA, CE, PB, PE, BA, MT, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



PIPERACEAE

Piper aduncum, PIPERACEAE - Pimenta longa -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, CE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Vivencial II Lago Norte - Brasília - DF.



Piper tuberculatum, PIPERACEAE - Pimenta longa -
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, ES, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Piper umbellatum, PIPERACEAE - Caapeba - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria; **Distribuição:** RR, AM, AC, CE, PE, BA, AL, MT, GO, MG, ES, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Área de Relevante Interesse Ecológico do Riacho Fundo - Brasília - DF.



POACEAE

Echinolaena inflexa, POACEAE - Capim-flecha - **Hábito:** Erva perene, cespitosa; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Úmido, Campo Rupestre (*stricto sensu*), Carrasco, Savanas amazônicas; **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MS, MG; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Loudetiopsis chrysothrix, POACEAE - **Hábito:** Erva anual ou perene; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sensu*), Carrasco; **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Trachypogon spicatus, POACEAE - **Hábito:** Erva perene, cespitosa; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Úmido, Brejo, Carrasco, Savanas amazônicas; **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



POLYGALACEAE

Securidaca diversifolia, POLYGALACEAE - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata; **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, GO, DF, MS, MG, ES, RJ, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



POLYGONACEAE

Triplaris americana, POLYGONACEAE – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*lato sensu*), Brejo; **Distribuição:** PA, AM, AC, MT, GO, MS, SP, PR; **Local da foto:** APA do Planalto Central – Brasília – DF.



Triplaris gardneriana, POLYGONACEAE - Formigueiro, Pau-formiga, Pajaú, Pajeú, Pau jaú - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata Ciliar, Mata Seca (Semidecídua, Decídua, Cerradão); **Distribuição:** MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, PR; **Local da foto:** Campus da Universidade de Brasília (UnB) - Brasília - DF.



PROTEACEAE

Roupala montana, PROTEACEAE - carne-de-vaca, carvalho-vermelho – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, PI, CE, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina – MG.



Roupala brasiliensis, PROTEACEAE - carne-de-vaca - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Transição Mata Seca com Cerrado, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Savanas amazônicas; **Distribuição:** MT, GO, DF, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



RHAMNACEAE

Colubrina glandulosa, RHAMNACEAE - Sobraji -
Hábito:- Árvore ou arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat**: Mata Ciliar, Mata de Galeria, Área antrópica, Cultivada; **Distribuição**: RR, PA, AC, RO, MA, CE, PB, PE, MT, DF, MG, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto**: Campus da Universidade de Brasília (UnB) - Brasília - DF.



RUBIACEAE

Cordia concolor (Sin: *Alibertia concolor*), RUBIACEAE
- **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Rupestre (*lato sensu*) Carrasco; **Distribuição:** PA, AM, TO, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR, SC; **Local da foto:** Parque Nacional do Grande Sertão Veredas – Chapada Gaúcha – MG.



Alibertia edulis, RUBIACEAE - Marmelo-de-bola, marmelada-preta, marmelada-de-bezerro - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Savanas amazônicas, Carrasco; **Distribuição:** PA, AM, TO, AC, MA, PI, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Cordia sessilis (Sin: *Alibertia sessilis*), RUBIACEAE
- Marmelada-de-cachorro - **Hábito:** Arvoreta;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata de Galeria, Mata Seca,
Cerradão, Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** MA, MT,
GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de
Brasília - Brasília - DF.



Augusta longifolia, RUBIACEAE – **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria; **Distribuição:** MA, BA, GO, DF, MG; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás – GO.



Diodella teres (Sin: *Diodia teres*), RUBIACEAE - corre-mundo - **Hábito:** Subarbusto ou erva ereta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerrado (*lato sensu*), Área antrópica, Daninha; **Distribuição:** PA, TO, PI, CE, PE, BA, MT, GO, DF, MG, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Genipa americana, RUBIACEAE - jenipapo - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerradão, área antrópica; **Distribuição:** AM, PA, TO, MA, PI, CE, RN, PB, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque da Cidade - Brasília - DF.



Guettarda viburnoides, RUBIACEAE - Veludo-branco, angélica - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** AP, PA, TO, MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



Palicourea coriacea, RUBIACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** AP, AM, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Parque Estadual Serra dos Pirineus – Pirenópolis – GO.



Palicourea marcgravii, RUBIACEAE - Erva-de-rato -
Hábito: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria, Cerradão, Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** PA, PE, BA, MT, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Palicourea rigida, RUBIACEAE - Bate-caixa - **Hábito:** Arvoreta ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Rupestre (*stricto sensu*), Campo de Murundus, Savanas amazônicas, Carrasco; **Distribuição:** PA, AM, AC, RO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Palicourea officinalis (Sin: *Palicourea squarrosa*),
RUBIACEAE - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Limpo; **Distribuição:** MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA, GO, DF, MG; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília -DF.



Perama hirsuta, RUBIACEAE – **Hábito:** Erva;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*lato sensu*),
Vereda, Campo Úmido, Savanas amazônicas;
Distribuição: PA, AM, PB, PE, BA, MT, MG, ES; **Local da
foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto
Paraíso de Goiás – GO.



Psychotria carthagenensis, RUBIACEAE - chacrona, rainha - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria; **Distribuição:** PA, AM, AC, MA, PB, PE, BA, AL, MT, MG, ES, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília - DF.



MS

Psychotria colorata, RUBIACEAE – **Hábito:** Subarbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata de Galeria, Mata Seca; **Distribuição:** PA, AM, MA, PB, PE, BA, SE, GO, DF; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás – GO.



Psychotria florestana, RUBIACEAE – **Hábito:** Arbusto;
Distribuição: MG, SP; **Local da foto:** Parque Estadual
da serra dos Pirineus – Pirenópolis – GO.



Richardia grandiflora, RUBIACEAE – **Hábito:** Erva anual ou perene; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata, Cerrado (*lato sensu*), Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo; **Distribuição:** PI, RN, PB, BA, GO, MS, MG, ES, SP, PR, SC, RS; **Local da foto:** BR 242 - Barreiras – BA.



Sabicea brasiliensis, RUBIACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Sujo (Seco ou Úmido); **Distribuição:** TO, MT, GO, DF, MS, MG; **Local da foto:** Cachoeira do Tororó – Brasília – DF.



Sipanea hispida, RUBIACEAE - **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Brejo; **Distribuição:** PA, AM, AC, RO, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Vivencial II Lago Norte - Brasília - DF.



Tocoyena formosa, RUBIACEAE - Jenipapo-de-cavalo
- **Hábito:** Arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Campo Rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** AP, PA, AM, MA, CE, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



RUTACEAE

Zanthoxylon rhoifolium, RUTACEAE - juvevê, mamica-de-cadela, mamica-de-porca - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão, Cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Esenbeckia pumila, RUTACEAE – **HÁBITO**: Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat**: Borda de Mata de Galeria, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo; **Distribuição**: TO, PI, BA, MT, GO, DF, MG; **Local da foto**: Chapada Imperial - Brazlândia – DF.



Esenbeckia grandiflora, RUTACEAE - chupa-ferro, guaxupita, mamonarana - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca Semidecídua; **Distribuição:** AC, RO, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante - GO.



Hortia oreadica (Sin: *Hortia brasiliana*), RUTACEAE -
para-tudo, quina, quina-do-campo - **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*stricto sensu*);
Distribuição: RO, MT, GO, DF, MS, MG; **Local da foto:**
Parque Estadual Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Spiranthera odoratissima, RUTACEAE - Manacá, manacá-do-cerrado - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo, Carrasco; **Distribuição:** PA, RO, MA, PI, BA, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



SANTALACEAE

Phoradendron caripense, SANTALACEAE - erva de passarinho - **Hábito:** Hemiparasita ou parasita/subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** BA, MG, MT, PB, AM; **Local da foto:** Parque Estadual do Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina - MG.



SAPINDACEAE

Magonia pubescens, SAPINDACEAE - Tingui -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata ciliar, Mata Seca, Cerradão, Cerrado denso;
Distribuição: RO, MA, PI, CE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP; **Local da foto:** Formosa - GO.



Sapindus saponaria, SAPINDACEAE - Saboneteira
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, Mata Seca Semidecídua, Capoeira, Cultivada;
Distribuição: TO, AC, PE, BA, SE, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



Serjania confertiflora, SAPINDACEAE - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Seca; **Distribuição:** BA, MT, GO, MS, SP, RJ; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Serjania velutina, SAPINDACEAE – **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata Ciliar, Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Campo Rupestre (*lato sensu*), Capoeira; **Distribuição:** MT, GO; **Local da foto:** Parque Estadual da Serra dos Pirineus – Pirenópolis – GO



SAPOTACEAE

Chrysophyllum marginatum, SAPOTACEAE -
Leiteirinho - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerrado; **Distribuição:** BA, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água -Brasília -DF



Pouteria ramiflora, SAPOTACEAE - Fruta-do-veado, maçaranduba, pessegueiro-do-cerrado, pitomba-de-leite - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Savanas amazônicas, Carrasco; **Distribuição:** PA, TO, RO, MA, PI, CE, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante -GO.



Pouteria torta, SAPOTACEAE - Grão-de-galo, guapeva
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** PA, AM, AC, RO, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Nacional do Grande Sertão Veredas – Chapada Gaúcha – MG.



SIPARUNACEAE

Siparuna guianensis, SIPARUNACEAE - Capitiú, Negramina, Mõe hanakë - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*); **Distribuição:** RO, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Estadual Serras de Caldas Novas – Caldas Novas – GO.



SIMAROUBACEAE

Simarouba versicolor, SIMAROUBACEAE - Mata-cachorro - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Savanas amazônicas; **Distribuição:** TO, RO, MA, PI, CE, BA, MG, GO, DF, MS, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



SOLANACEAE

Solanum lycocarpum, SOLANACEAE - Lobeira, fruta-de-lobo - **Hábito:** Arvoreta ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo Sujo, Área antrópica; **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Solanum palinacanthum, SOLANACEAE - Jurubeba, joá
- **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Área Antrópica, Daninha; **Distribuição:** PA, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



STYRACACEAE

Styrax ferrugineus, STYRACACEAE - Laranjinha – **Hábito:** Árvore ou arvoreta; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (*stricto sensu*), Vereda, Campo com Murundus; **Distribuição:** RO, MT, GO, DF, MS, MG, SP, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



TURNERACEAE

Turnera longiflora, TURNERACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), Campo Sujo, Campo Limpo; **Distribuição:** TO, GO, DF, MG; **Local da foto:** APA do Planalto Central - Brasília - DF.



URTICACEAE

Cecropia hololeuca, URTICACEAE - Embaúba-branca, embaúba-prateada, embaúba-açú - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, área antrópica; **Distribuição:** BA, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Parque Estadual do Rio Preto - São Gonçalo do Rio Preto - MG.



Cecropia pachystachya, URTICACEAE - Embaúba -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, mata seca, cerrado (*lato sensu*), vereda, savanas amazônicas; **Distribuição:** PA, AM, MA, PI, CE, PA, PE, BA, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



VELLOZIACEAE

Barbacenia umbrosa, VELLOZIACEAE – **Hábito:** Erva;
Fitofisionomia ou Habitat: Campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: MG; **Local da foto:** Parque Estadual do
Biribiri - Serra do Espinhaço - Diamantina – MG.



Vellozia caruncularis, VELLOZIACEAE – **Hábito:** Erva;
Fitofisionomia ou Habitat: Campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: MG; **Local da foto:** Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros - Cavalcante – GO.



Vellozia hemispherica, VELLOZIACEAE – **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio - Chapada Diamantina - Palmeiras - BA.



Vellozia squamata (Sin: *Vellozia flavicans*),
VELLOZIACEAE - Canela-de-ema - **Hábito:**
Subarbusto ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:**
Cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



VERBENACEAE

Lantana canescens, VERBENACEAE - **Hábito:** Arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata, área antrópica; **Distribuição:** AM, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Jardim Zoológico de Brasília - Brasília - DF.



Lantana trifolia, VERBENACEAE – **Hábito:** Subarbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata seca semidecídua, cerrado (*stricto sensu*), capoeira, área antrópica, daninha;
Distribuição: AP, PA, AM, AC, RO, MT, GO, DF, MS, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília – DF.



Lippia florida, VERBENACEAE - **Hábito:** Arbusto;
Fitofisionomia ou Habitat: Cerrado (*lato sensu*),
campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** MG; **Local
da foto:** Parque Nacional do Grande Sertão Veredas -
Chapada Gaúcha - MG.



Lippia lacunosa, VERBENACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*), cerradão; **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MG; **Local da foto:** Chapada Imperial - Brazlândia - DF.



Lippia lupulina, VERBENACEAE – **Hábito:** Subarbusto ou arbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo rupestre (*lato sensu*), cerradão, borda de mata, vereda, campo sujo, campo limpo; **Distribuição:** AM, MT, DF, MS, MG; **Local da foto:** Parque Nacional de Brasília - Brasília – DF.



Petrea volubilis, VERBENACEAE - Viuvinha – **Hábito:** Trepadeira arbustiva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata de galeria, cerrado (*lato sensu*), área antrópica; **Distribuição:** PA, AM, BA, MG, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília – DF.



Stachytarpheta glauca, VERBENACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo sujo; **Distribuição:** GO; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante – GO.



Stachytarpheta longispicata, VERBENACEAE - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo sujo; **Distribuição:** GO, DF, MG; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Stachytarpheta radlkoferiana, VERBENACEAE – **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo rupestre (*lato sensu*); **Distribuição:** BA; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada Diamantina - Cachoeira da Fumaça - Serra da Larguinha - Palmeiras – BA.



VIOLACEAE

Hybanthus calceolaria, VIOLACEAE - Falsa ipecacuanha, poia - **Hábito:** Subarbusto; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), campo, savanas amazônicas, restinga, área antrópica; **Distribuição:** RR, PA, AM, TO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, DF, MS, MG, ES, SP, RJ; **Local da foto:** Parque Estadual Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



VITACEAE

Cissus verticillata, VITACEAE – **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, mata seca semidecídua, cerrado (*lato sensu*), brejo, capoeira, área antrópica; **Distribuição:** RR, AM, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



Cissus erosa, VITACEAE - Cipó-de-fogo - **Hábito:** Trepadeira; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata ciliar, cerrado (*stricto sensu*), campo, savanas amazônicas, capoeira; **Distribuição:** RR, AM, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA AL, SE, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Parque Olhos D'Água - Brasília - DF.



VOCHYSIACEAE

Callisthene major, VOCHYSIACEAE - Jacaré, Pau Terra do Mato – **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerrado (*lato sensu*); **Distribuição:** TO, BA, MT, GO, DF, MS, MG, RS, PR, SC; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cavalcante – GO.



Qualea dichotoma, VOCHYSIACEAE – **Hábito:** Árvore;
Fitofisionomia ou Habitat: Mata de galeria, Mata seca, cerrado, cerrado (*lato sensu*), campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: MT, GO, MG, ES, SP, RJ e todo nordeste;
Local da foto: Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Qualea grandiflora, VOCHYSIACEAE - Pau-terra-grande
- **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, borda de mata ciliar, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), campo sujo, campo com murundus, savanas amazônicas, carrasco; **Distribuição:** PA, AM, AC, MA, PI, CE, BA, MT, GO, MG, SP, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Qualea multiflora, VOCHYSIACEAE - Pau-terra-liso -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Borda de mata de galeria, cerradão, cerrado (*stricto sensu*), vereda, campo com murundus; **Distribuição:** MA, PI, BA, MT, GO, DF, MG, SP, RJ, PR; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Qualea parviflora, VOCHYSIACEAE - Pau-terra-miúdo, Pau-terra-roxo - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão, cerrado (*stricto sensu*), vereda, campo sujo, carrasco; **Distribuição:** PA, AM, MA, PI, CE, BA, MT, GO, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Salvertia convallariodora, VOCHYSIACEAE - Bate-caixa, Chapéu-de-couro - **Hábito:** Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado (*stricto sensu*), savanas amazônicas, carrasco; **Distribuição:** PA, AM, TO, MA, PI, BA, MT, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Parque Nacional do Grande Sertão Veredas - Chapada Gaúcha - MG.



Vochysia elliptica, VOCHYSIACEAE - Pau-doce -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerrado
(*stricto sensu*), campo sujo, campo rupestre (*lato sensu*);
Distribuição: PE, BA, GO, DF, MG, RJ; **Local da foto:**
Parque Estadual da Serra dos Pirineus - Pirenópolis - GO.



Vochysia thyrsoidea, VOCHYSIACEAE - Gomeira -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Cerradão,
cerrado (*stricto sensu*), campo sujo; **Distribuição:** CE,
BA, GO, DF, MG, SP; **Local da foto:** Jardim Botânico de
Brasília - Brasília - DF.



Vochysia tucanorum, VOCHYSIACEAE - Tucaneira -
Hábito: Árvore; **Fitofisionomia ou Habitat:** Mata ciliar, mata de galeria, cerrado (*stricto sensu*), vereda; **Distribuição:** BA, MT, GO, DF, MG, SP, RJ, PR, SC; **Local da foto:** Alto Paraíso de Goiás - GO.



XYRIDACEAE

Xyris jupicai, XYRIDACEAE - Botão-de-ouro - **Hábito:** Erva; **Fitofisionomia ou Habitat:** Campo limpo úmido, campo rupestre; **Distribuição:** BA, DF, GO, MG, SC, TO; **Local da foto:** Jardim Botânico de Brasília - Brasília - DF.



Abolboda pulchella, XYRIDACEAE - **Hábito:** Erva;
Fitofisionomia ou Habitat: Vereda, campo úmido,
campo rupestre (*lato sensu*), savanas amazônicas;
Distribuição: PA, AM, RO, BA, MT, GO, DF, MG,
SP; **Local da foto:** Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros, Cavalcante - GO.

Políticas Públicas para o Cerrado no âmbito do MMA

Fernando C.P. Tatagiba e João de Deus Medeiros

A implementação de ações de proteção e valorização dos recursos naturais do bioma Cerrado deve ser reconhecida como iniciativa estratégica pelo governo e sociedade, notadamente considerando a grande riqueza natural do bioma e que sua integridade encontra-se seriamente ameaçada. Descrevemos abaixo, de forma sucinta, as principais políticas públicas coordenadas pelo Governo Federal, cujos objetivos principais são promover a conservação, a restauração, a recuperação e o manejo sustentável, com a promoção e valorização dos conhecimentos das populações tradicionais do bioma.

Lista Nacional das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção

A diversidade biológica no Cerrado é destacável, contudo as lacunas no conhecimento são igualmente significativas. Ciente disso, o Departamento de Conservação da Biodiversidade da Secretaria de Biodiversidade e Florestas trabalha continuamente no levantamento e sistematização de estudos que indiquem o grau de ameaça de extinção de espécies da flora brasileira. Fruto deste esforço, o MMA edita listagens contendo as espécies reconhecidamente ameaçadas. A lista vigente é apresentada pela Instrução Normativa MMA nº 06, de 23 de setembro de 2008. A IN MMA nº 06/08 reconhece, ainda, as espécies da flora brasileira com deficiência de dados que possibilitem a classificação quanto ao grau de ameaça.

Das espécies contidas no Anexo I da IN 06/08, 132 ocorrem no bioma Cerrado, das quais quatro estão presentes neste Guia de Campo: *Attalea brasiliensis*, *Hyptis imbricatiformis*, *Myracrodruon urundeuva* e *Orthophytum amoenum*.

Áreas Protegidas

Na legislação brasileira é possível encontrar diferentes modalidades de áreas protegidas. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 20 e 321, estabelece condições para as chamadas terras indígenas, que no Cerrado correspondem a 4,4% da área do bioma. As áreas destinadas aos povos remanescentes de quilombos também têm grande potencial para conservação da biodiversidade. Neste Guia de Campo, duas espécies foram fotografadas no Território Kalunga, considerado o maior quilombo do mundo, com 254 mil hectares, situado nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, no nordeste goiano.

Entre as políticas de áreas protegidas merece destaque a que rege a criação e consolidação de unidades de conservação da natureza, cujos moldes estão previstos na Lei 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC 2011), 8,1% do bioma Cerrado encontra-se protegido por Unidades de Conservação. Destas, 3,1% são de Proteção Integral e 5% de Uso Sustentável, principalmente APAs (4,9%). O Cerrado conta atualmente com 189 unidades de conservação cadastradas no CNUC, sendo 139 estaduais, 49 federais e apenas uma municipal, que é o Parque Natural Municipal do Alto Rio Tanque, no Município de Itabira-MG. Vale lembrar que, para ser beneficiária de recursos oriundos da Compensação Ambiental, a unidade de conservação deve estar cadastrada no CNUC. Desta forma, das UCs municipais do Cerrado, apenas o Parque Natural Municipal do Alto Rio Tanque estaria apto a receber tais recursos. Destacamos que é papel do gestor municipal realizar tal cadastramento.

Das espécies apresentadas neste guia mais de 400 foram fotografadas em unidades de conservação, federais, estaduais, municipais e privadas, assim como em outras formas de áreas protegidas. Das espécies retratadas em unidades de conservação de proteção integral, 64 foram no PARNA da Chapada dos Veadeiros, 33 no PARNA de Brasília, 12 no PARNA da Chapada Diamantina, 06 no PARNA Grande Sertão Veredas. Em parques estaduais, este Guia retrata 19 no Parque Estadual do Biribiri (MG), 35 no Parque Estadual da Serra dos Pirineus (GO), 03 no Parque

Estadual Terra Ronca (GO), 02 no Parque Estadual do Rio Preto (MG); e 24 no Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio (BA). Das espécies retratadas em unidades de conservação de uso sustentável, 163 foram registradas na APA do Planalto Central, sendo 98 no Jardim Botânico de Brasília, 31 na Chapada Imperial, 06 nas proximidades da Cachoeira do Tororó e 02 no Jardim Zoológico de Brasília; duas espécies foram fotografadas na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Vaga Fogo, localizada no município de Pirenópolis, Goiás.

Mesmo áreas que não se configuram como unidades de conservação, nos moldes previstos pelo SNUC, podem abrigar espécimes da flora e fauna nativas. Um exemplo é o Parque Olhos D'Água, situado em plena área urbana de Brasília. Neste local, que é destinado ao lazer e a prática de exercícios físicos, foram registradas 53 espécies contidas neste Guia.

Além das terras públicas, áreas privadas têm uma importante contribuição para a proteção dos recursos naturais. O próprio SNUC prevê uma categoria privada de unidades de conservação, a Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN. Segundo a Confederação Nacional de RPPN, o Cerrado conta com 191 RPPNs em seu território, que conservam uma área superior a 156 mil hectares. O Código Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65), também institui importantes instrumentos de proteção em terras privadas, sendo os mais importantes as Áreas de Preservação Permanente (APPs) e as Reservas Legais, que no Cerrado correspondem a 20% das propriedades rurais e 35% em áreas de Cerrado na Amazônia Legal.

Programa de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado – Programa Cerrado Sustentável

Estabelecido pelo Decreto nº 5.577, de 08 de novembro de 2005, O Programa Cerrado Sustentável tem o objetivo de promover a conservação, a restauração, a recuperação e o manejo sustentável de ecossistemas naturais, bem como a valorização e o reconhecimento de suas populações tradicionais, buscando condições para reverter impactos socioambientais negativos do processo de ocupação. O Programa Cerrado Sustentável é um instrumento orientador das políticas, apresentando as

diretrizes estratégicas para promover o uso sustentável e a conservação do Bioma.

Um importante desdobramento do Programa Cerrado Sustentável é o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado), lançado em setembro de 2010. O Programa contempla 38 ações de Monitoramento e Controle, 20 ações relacionadas à Áreas Protegidas e Ordenamento Territorial, 73 ações de Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis e 20 ações de Educação Ambiental, totalizando 151 ações a serem implementadas por diversos ministérios e instituições vinculadas.

Com a finalidade de acompanhar e avaliar a implementação do Programa Cerrado Sustentável, inclusive a execução de suas ações, o Governo Federal criou, por meio do Decreto nº 5.577 de 2005, a Comissão Nacional do Programa Cerrado Sustentável-CONACER. O colegiado, cuja composição foi renovada pela Portaria MMA nº 252/2011, conta com a representação de diversos setores de governo e da sociedade civil.

Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM)

O MMA, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), elaborou o Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Socio-biodiversidade (PNPSB). Por meio da Portaria Interministerial MMA/MDA/MDS nº 236, de 21 de julho de 2009, foram estabelecidas as orientações para a implementação do PNPSB. De acordo com os trabalhos realizados entre MMA e Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB, o babaçu, o pequi, a mangaba e o barú foram incluídos na pauta de produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). Com esse respaldo legal, alguns produtos do extrativismo do Cerrado passaram a contar com subvenção econômica no momento da venda, o que os torna economicamente atrativos para as comunidades.

Lista de Espécies da Flora do Brasil

Como signatário da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), o Brasil assumiu uma série de compromissos para 2010, dentre os quais a implementação da Estratégia Global para Conservação de Plantas (GSPC). Das metas es-

tabelecidas pela GSPC, a primeira é a elaboração de uma lista acessível das espécies conhecidas de plantas de cada país. Para alcançar esta meta, o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, foi designado para coordenar a elaboração da “Lista de Espécies da Flora do Brasil” (<http://flora-dobrasil.jbrj.gov.br/2010/>), que está disponível para toda a sociedade desde 2010. A lista apresenta um total de 40.982 espécies da flora brasileira, sendo 3.608 de Fungos, 3.495 de Algas, 1.521 de Briófitas, 1.176 de Pteridófitas, 26 de Gimnospermas e 31.156 de Angiospermas.

A Lista de Espécies da Flora do Brasil foi uma valiosa ferramenta na elaboração deste Guia, tendo sido amplamente utilizada durante toda a etapa de revisão nomenclatural e taxonômica das espécies e famílias botânicas aqui contidas.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NO CERRADO

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS¹

- 1 APA CAVERNAS DO PERUAÇU - MG
- 2 APA DA BACIA DO RIO DESCOBERTO - DF-GO
- 3 APA DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU - DF
- 4 APA SERRA DA TABATINGA - TO
- 5 APA DELTA DO PARNAÍBA-CE-MA-PI
- 6 APA CARSTE DE LAGOA SANTA - MG
- 7 APA DO PLANALTO CENTRAL - DF-GO
- 8 APA MEANDROS DO RIO ARAGUAIA - GO-MT-TO
- 9 APA MORRO DA PEDREIRA - MG
- 10 APA DAS NASCENTES DO RIO VERMELHO -GO
- 11 APA SERRA DA IBIAPABA - CE-PI
- 12 ARIE CAPETINGA – TAQUARA - DF
- 13 ARIE CERRADO PÉ-DE-GIGANTE - SP
- 14 ARIE MATA DE SANTA GENEBRA - SP
- 15 ARIE MATÃO DE COSMÓPOLIS - SP
- 16 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE IQUÊ - MT
- 17 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE PIRAPITINGA - MG
- 18 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE URUÇUI-UNA - PI
- 19 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA SERRA DAS ARARAS - MT
- 20 ESTAÇÃO ECOLÓGICA SERRA GERAL DO TOCANTINS - BA-TO
- 21 FLORESTA NACIONAL DE CAPÃO BONITO - SP
- 22 FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA - DF
- 23 FLORESTA NACIONAL DE CRISTÓPOLIS - BA
- 24 FLORESTA NACIONAL DE PARAÓPEBA - MG
- 25 FLORESTA NACIONAL DE SILVÂNIA - GO
- 26 FLORESTA NACIONAL DA MATA GRANDE - GO
- 27 PARQUE NACIONAL CAVERNAS DO PERUAÇU - MG
- 28 PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
- 29 PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS - GO
- 30 PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BODOQUENA - MS
- 31 PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA - MG
- 32 PARQUE NACIONAL DA SERRA DAS CONFUSÕES - PI

1 Cadastro Nacional de Unidades de Conservação

- 33 PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ - MG
- 34 PARQUE NACIONAL DAS EMAS - GO
- 35 PARQUE NACIONAL DAS NASCENTES DO RIO PARNAIBA - BA-MA-TO-PI
- 36 PARQUE NACIONAL DAS SEMPRE-VIVAS - MG
- 37 PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA - DF
- 38 PARQUE NACIONAL DO ARAGUAIA - TO
- 39 PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES - MA
- 40 PARQUE NACIONAL GRANDE SERTÃO VEREDAS - BA-MG
- 41 RESERVA BIOLÓGICA DA CONTAGEM - DF
- 42 REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DAS VEREDAS DO OESTE BAIANO - BA
- 43 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DO DELTA DO PARNAIBA - MA-PI
- 44 RESERVA EXTRATIVISTA DA MATA GRANDE - MA
- 45 RESERVA EXTRATIVISTA EXTREMO NORTE DO TOCANTINS - TO
- 46 PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS - MA
- 47 RESERVA EXTRATIVISTA DE RECANTO DAS ARARAS DE TERRA RONCA - GO
- 48 RESERVA EXTRATIVISTA LAGO DO CEDRO - GO
- 49 RESERVA EXTRATIVISTA CHAPADA LIMPA - MA

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS²

- 1 APA³ CORUMBATAÍ BOTUCATU TEJUPA PERIMETRO BOTUCATU - SP
- 2 APA CORUMBATAÍ, BOTUCATU E TEJUPÁ PERIMETRO CORUMBATAÍ - SP
- 3 APA ÁGUAS VERTENTES - MG
- 4 APA BACIA DO RIO DE JANEIRO - BA
- 5 APA BACIA DO RIO PANDEIROS - MG
- 6 APA COCHÁ E GIBÃO - MG
- 7 APA DA BAIXADA MARANHENSE - MA
- 8 APA DA CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
- 9 APA DA FOZ DO RIO DAS PREGUIÇAS - PEQUENOS LENÇÓIS - REGIÃO LAGUNAR ADJACENTE - MA
- 10 APA DA SERRA DA JIBÓIA - GO
- 11 APA DA SERRA DOS PIRENEUS - GO
- 12 APA DA SERRA DOURADA - GO
- 13 APA DAS BACIAS DO GAMA E CABEÇA DE VEADO - DF
- 14 APA DE CAFURINGA - DF
- 15 APA DE SÃO DESIDÉRIO - BA
- 16 APA DE UPAON-AÇU / MIRITIBA / ALTO PREGUIÇAS - MA
- 17 APA DO ENCANTADO - GO
- 18 APA DO JALAPÃO - TO
- 19 APA DO LAGO DE PALMAS - TO
- 20 APA DO LAGO DE SOBRADINHO - BA
- 21 APA DO LAGO PARANOÁ - DF
- 22 APA DO RIO PRETO - BA
- 23 APA DO SALTO MAGESSI - MT
- 24 APA DOS MORROS GARAPENSES - MA
- 25 APA DUNAS E VEREDAS DO BAIXO MÉDIO SÃO FRANCISCO - BA
- 26 APA ESTADUAL DA ESCARPA DEVONIANA - PR
- 27 APA ESTADUAL PÉ DA SERRA AZUL - MT
- 28 APA ESTRADA PARQUE DE PIRAPUTANGA - MS
- 29 APA FOZ DO RIO SANTA TERESA - TO
- 30 APA IBITINGA - SP
- 31 APA ILHA DO BANANAL/CANTÃO - TO
- 32 APA JOÃO LEITE - GO
- 33 APA LAGO DE PEIXE / ANGICAL - TO
- 34 APA LAGO DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS, PARANÁ - TO
- 35 APA LAJEDÃO - MG
- 36 APA MORRO DE SÃO BENTO - SP
- 37 APA NASCENTES DO ARAGUAIA - TO
- 38 APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - MT
- 39 APA PIRACICABA JUQUERI MIRIM ÁREA I - SP
- 40 APA PIRACICABA JUQUERI-MIRIM ÁREA II - SP
- 41 APA POUSO ALTO - GO

- 2 Cadastro Nacional de Unidades de Conservação
- 3 APA - Área de Proteção Ambiental

- 42 APA RIO BATALHA - SP
- 43 APA RIO CÊNICO ROTAS MONÇOEIRAS - MS
- 44 APA SERRA DAS GALÉS E DA PORTARIA - GO
- 45 APA SERRA DO LAJEADO - TO
- 46 APA SERRA DO SABONETAL - MG
- 47 APA SERRA GERAL DE GOIÁS - GO
- 48 ARIE⁴ ÁGUAS DE SÃO JOÃO - GO
- 49 ARIE CERRADÃO - DF
- 50 ARIE CRULS - DF
- 51 ARIE DA GRANJA DO IPÊ - DF
- 52 ARIE DA VILA ESTRUTURAL - DF
- 53 ARIE DO BOSQUE - DF
- 54 ARIE DO CÔRREGO CABECEIRA DO VALO - DF
- 55 ARIE DO CÔRREGO MATO GRANDE - DF
- 56 ARIE DO TORTO - DF
- 57 ARIE DOM BOSCO - DF
- 58 ARIE PARANOÁ SUL - DF
- 59 ARIE PARQUE JK - DF
- 60 ARIE SANTUÁRIO SILVESTRE DO RIACHO FUNDO - DF
- 61 ESTAÇÃO ECOLÓGICA ANGATUBA - SP
- 62 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ACAUÁ - MG
- 63 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS - DF
- 64 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ASSIS - SP
- 65 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE BAURU - SP
- 66 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE CORUMBÁ - MG
- 67 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE PARANAPANEMA - SP
- 68 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO BARREIRO RICO - SP
- 69 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BOTÂNICO - DF
- 70 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO RIO PRETO - BA
- 71 ESTAÇÃO ECOLÓGICA IBICATU - SP
- 72 ESTAÇÃO ECOLÓGICA ITABERÁ - SP
- 73 ESTAÇÃO ECOLÓGICA ITAPEVA - SP
- 74 ESTAÇÃO ECOLÓGICA ITIRAPINA - SP
- 75 ESTAÇÃO ECOLÓGICA JATAÍ - SP
- 76 ESTAÇÃO ECOLÓGICA MATA DOS AUSENTES - MG
- 77 ESTAÇÃO ECOLÓGICA MOGI-GUAÇÚ - SP
- 78 ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIBEIRÃO PRETO - SP
- 79 ESTAÇÃO ECOLÓGICA SAGARANA - MG
- 80 ESTAÇÃO ECOLÓGICA SANTA BÁRBARA - SP
- 81 ESTAÇÃO ECOLÓGICA SANTA MARIA - SP
- 82 ESTAÇÃO ECOLÓGICA SÃO CARLOS - SP
- 83 FLORESTA ESTADUAL DO ARAGUAIA - GO
- 84 MONUMENTO NATURAL DA GRUTA DO LAGO AZUL - MS
- 85 MONUMENTO NATURAL DAS ÁRVORES FOSSILIZADAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TO
- 86 MONUMENTO NATURAL DO CONJUNTO ESPELEOLÓGICO DO MORRO DA PEDREIRA - DF
- 87 MONUMENTO NATURAL DO RIO FORMOSO - MS
- 88 PARQUE ESTADUAL ÁGUAS DO CUIABÁ - MT
- 89 PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO DE MOURA PACHECO - GO
- 90 PARQUE ESTADUAL BIRIBIRI - MG
- 91 PARQUE ESTADUAL CAMINHO DOS GERAIS - MG
- 92 PARQUE ESTADUAL CAMPOS ALTOS - MG
- 93 PARQUE ESTADUAL DA LAPA GRANDE - MG
- 94 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS NOVAS - GO
- 95 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE SONORA - MS
- 96 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO CABRAL - MG
- 97 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOURADA - GO
- 98 PARQUE ESTADUAL DAS NASCENTES DO RIO TAQUARI - MS
- 99 PARQUE ESTADUAL DE ÁGUAS QUENTES - MT
- 100 PARQUE ESTADUAL DE MIRADOR - MA
- 101 PARQUE ESTADUAL DE PARAÚNA - GO
- 102 PARQUE ESTADUAL DE TERRA RONCA - GO
- 103 PARQUE ESTADUAL DE VASSUNUNGA - SP
- 104 PARQUE ESTADUAL DO ARAGUAIA - MT
- 105 PARQUE ESTADUAL DO ARAGUAIA - GO

4 ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico

106 PARQUE ESTADUAL DO CANTÃO - TO
 107 PARQUE ESTADUAL DO CERRADO - PR
 108 PARQUE ESTADUAL DO DESCOBERTO - GO
 109 PARQUE ESTADUAL DO JALAPÃO - TO
 110 PARQUE ESTADUAL DO LAJEADO - TO
 111 PARQUE ESTADUAL DO PROSA - MS
 112 PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO - MG
 113 PARQUE ESTADUAL DOM OSÓRIO STOFFEL - MT
 114 PARQUE ESTADUAL DOS PIRINEUS - GO
 115 PARQUE ESTADUAL FURNAS DO BOM JESUS - SP
 116 PARQUE ESTADUAL GRÃO MOGOL - MG
 117 PARQUE ESTADUAL GRUTA DA LAGOA AZUL - MT
 118 PARQUE ESTADUAL LAGOA DO CAJUEIRO - MG
 119 PARQUE ESTADUAL MATAS DO SEGREDO - MS
 120 PARQUE ESTADUAL MONTEZUMA - MG
 121 PARQUE ESTADUAL PAU FURADO - MG
 122 PARQUE ESTADUAL RIO PRETO - MG
 123 PARQUE ESTADUAL SERRA AZUL - MT
 124 PARQUE ESTADUAL SERRA DA BOA ESPERANÇA - MG
 125 PARQUE ESTADUAL SERRA DAS ARARAS - MG
 126 PARQUE ESTADUAL SERRA DO INTENDENTE - MG
 127 PARQUE ESTADUAL SERRA NEGRA - MG
 128 PARQUE ESTADUAL SERRA NOVA - MG
 129 PARQUE ESTADUAL SERRA VERDE - MG
 130 PARQUE ESTADUAL VERDE GRANDE - MG
 131 PARQUE ESTADUAL VEREDAS DO PERUAÇU - MG
 132 REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE CORIXÃO DA MATA AZUL- MT
 133 REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE QUELÔNIOS DO ARAGUAIA - MT
 134 REFÚGIO ESTADUAL DE VIDA SILVESTRE RIO PANDEIRO - MG
 135 RESERVA BIOLÓGICA DO GAMA - DF
 136 RESERVA BIOLÓGICA DO GUARÁ - DF
 137 RESERVA BIOLÓGICA DO RIO DESCOBERTO - DF
 138 RESERVA BIOLÓGICA SERRA AZUL - MG
 139 RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL VEREDAS DO ACARI - MG

RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL⁵

1 GUARA I - COCOS - BA
 2 GUARA II - COCOS - BA
 3 SÃO FRANCISCO DA TRIJUNÇÃO - COCOS - BA
 4 LAGOA DO FORMOSO - COCOS - BA
 5 ADILIA PARAGUAÇU BATISTA - MUCUGÊ - BA
 6 RESERVA ITAGUARI - COCOS - BA
 7 CHÁKRA GRISU - BRASÍLIA - DF
 8 SANTUÁRIO ECOLÓGICO SONHEM - BRASÍLIA - DF
 9 MARIA VELHA - BRASÍLIA - DF
 10 RESERVA CÔRREGO DA AURORA - BRASÍLIA - DF
 11 RESERVA ITAPUÁ - LUZIÂNIA - GO
 12 FAZENDA VAGA FOGO BOA VISTA - PIRENÓPOLIS - GO
 13 PARQUE DA CAPETINGA - SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO
 14 VALE DO PARANÁ - FORMOSA - GO
 15 RESERVA POUSADA DAS ARARAS - SERRANÓPOLIS - GO
 16 FAZENDA PINDORAMA - CRISTALINA - GO
 17 SERRA DOS TOPÁZIOS - CRISTALINA - GO
 18 FAZENDA VEREDA DO GATO - CRISTALINA - GO
 19 FAZENDA BRANCAS TERRA DOS ANÕES - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO
 20 CARA PRETA - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO
 21 FAZENDA MATA FUNDA - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO
 22 VALE DOS SONHOS - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO
 23 ESCARPAS DO PARAÍSO - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO
 24 VITA PARQUE - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO
 25 TERRA DO SEGREDO - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO
 26 RESERVA SANTUÁRIO DE GABRIEL - PIRENÓPOLIS - GO

5 Confederação Nacional de RPPN

- 27 SANTUÁRIO DE VIDA SILVESTRE FLOR DAS ÁGUAS - PIRENÓPOLIS - GO
- 28 RESERVA BOCA DA MATA - ARUANÁ - GO
- 29 SÍTIO ESTRELA DALVA - CIDADE OCIDENTAL - GO
- 30 FAZENDA CACHOEIRA BOA VISTA - COCALZINHO DE GOIÁS - GO
- 31 BIOSANTUÁRIO TRAJETO DO CERRADO - COCALZINHO DE GOIÁS - GO
- 32 FAZENDA CACHOEIRINHA - PADRE BERNARDO - GO
- 33 FAZENDA JAQUANÉZ - PARAÚNA - GO
- 34 JOÃO DE BARRO - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO
- 35 RESERVA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA BANANA MENINA - HIDROLÂNDIA - GO
- 36 PONTAL DE JABURU - NOVA CRIXÁS - GO
- 37 RESERVA FAZENDA SANTA BRANCA - TEREZÓPOLIS DE GOIÁS - GO
- 38 RESERVA ECOLÓGICA SERRA DOURADA - TROMBAS - GO
- 39 RESERVA SANTA MÔNICA - CORUMBÁ DE GOIÁS - GO
- 40 FAZENDA BOM SUCESSO - GOIANÁPOLIS - GO
- 41 RESERVA ECOLÓGICA CACHOEIRA DAS ANDORINHAS - APORÉ - GO
- 42 RESERVA ECOLÓGICA RIO VERMELHO BRITÂNIA - GO
- 43 VARANDA DA SERRA - CAVALCANTE - GO
- 44 SOLUAR - CAVALCANTE - GO
- 45 CACHOEIRA DAS PEDRAS BONITAS - COLINAS DO SUL - GO
- 46 FAZENDA SANTA LUZIA - TABERAÍ - GO
- 47 CACHOEIRA DO PROFETA - PLANALTINA - GO
- 48 VALE DAS ARARAS - CAVALCANTE - GO
- 49 DA BACIA DO RIBEIRÃO COCAL - PLANALTINA - GO
- 50 APA DA LAGOA - PLANALTINA - GO
- 51 CHÁCARA MANGUEIRAS - GOIÂNIA - GO
- 52 FAZENDA PALMEIRA - PALMEIRAS DE GOIÁS - GO
- 53 VALE ENCANTADO DA CACHOEIRA DOS CRISTAIS - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO
- 54 FAZENDA CAMPO ALEGRE - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO
- 55 FAZENDA GLEBA VARGEM GRANDE I - PIRENÓPOLIS - GO
- 56 FAZENDA ARRUDA - PIRENÓPOLIS - GO
- 57 CANTO DA MATA - PIRENÓPOLIS - GO
- 58 RESERVA SERRA DO TOMBADOR - CAVALCANTE - GO
- 59 FAZENDA PANTANAL - CODÓ - MA
- 60 FAZENDA SÃO FRANCISCO - BACABAL - MA
- 61 FAZENDA BAÚ - POMPEU - MG
- 62 FAZENDA ECOLÓGICA - GURINHATÁ - MG
- 63 ERMO DOS GERAIS - SANTANA DO RIACHO - MG
- 64 SANTUÁRIO VERDEAS DO SÃO MIGUEL - UNAÍ - MG
- 65 FAZENDA OLHOS D'ÁGUA - SACRAMENTO - MG
- 66 SUCURY - PATOS DE MINAS - MG
- 67 VALE DO PARAUNINHA - SANTANA DO RIACHO - MG
- 68 ALDEIA - CHAPADA GAÚCHA - MG
- 69 CACHOEIRA DA SUCUPIRA - UBERLÂNDIA - MG
- 70 ANTÔNIO PEDRO DE OLIVEIRA - MORADA NOVA DE MINAS - MG
- 71 COTOVELO - BRASILÂNDIA DE MINAS - MG
- 72 DIADORIM - ITACAMBIRA - MG
- 73 FAZENDA RESERVA LAGOA DA CAPA - COROMANDEL - MG
- 74 GIBÃO/FLEIXEIRAS - BONITO DE MINAS - MG
- 75 RESERVA DO GIBÃO - BONITO DE MINAS - MG
- 76 RESERVA ÁGUA LIMPA - GUARDA-MOR - MG
- 77 RESERVA DO TRIÂNGULO I - BONITO DE MINAS - MG
- 78 FAZENDA CARNEIRO - LAGAMAR - MG
- 79 FAZENDA CAMPOS DE SÃO DOMINGOS - DIAMANTINA - MG
- 80 NOSSA SENHORA APARECIDA - ENGENHEIRO NAVARRO - MG
- 81 PANELEIROS - FORMIGA - MG
- 82 BRUMAS DO ESPINHAÇO - SANTANA DO RIACHO - MG
- 83 ALTO DO PALÁCIO - SANTANA DO RIACHO - MG
- 84 HORTO CARBONITA B - CARBONITA - MG
- 85 HORTO CARBONITA C - CARBONITA - MG
- 86 HORTO CARBONITA I - CARBONITA - MG
- 87 FAZENDA DA GLÓRIA - SANTO HIPÓLITO - MG
- 88 FAZENDA BARRÃO - TRÊS MARIAS - MG
- 89 FAZENDA LAVAGEM - TRÊS MARIAS - MG
- 90 FAZENDA MALHADA ALTA - CORINTO - MG
- 91 CONTENDAS - COROMANDEL - MG

92 IAOPA AGRAPECUÁRIA - COROMANDEL - MG
93 RESERVA DO MUQUEM - COROMANDEL - MG
94 VALE ENCANTADO - UBERABA - MG
95 JULIANO BANKO - GRÃO MOGOL - MG
96 SÍTIO DOS BORGES - ITABIRA - MG
97 SOL NASCENTE - PEDRO LEOPOLDO - MG
98 FAZENDA SUCUPIRA - ARINOS - MG
99 PORTO CAJUEIRO - JURUAIA - MG
100 LAFARGE - ARCOS - MG
101 VEREDA DA CARAIBA - BONITO DE MINAS - MG
102 ÁGUA BOA - OLHOS-D'-GUA - MG
103 FAZENDA DO ARRENEGADO - OLHOS-D'-GUA - MG
104 FAZENDA SERRA DO CABRAL E LAZÃO - BUENÓPOLIS - MG
105 ARIZONA - SANTA VITÓRIA - MG
106 FAZENDA ALEGRIA - CARMO DO RIO CLARO - MG
107 ECOCERRADO BRASIL - ARAXÁ - MG
108 GENTIO - CORINTO - MG
109 VARGEM DO RIO DAS PEDRAS - SANTANA DO RIACHO - MG
110 EBQ - TAQUARAÇU DE MINAS - MG
111 MATO VIRGEM DO LOGRADOURO - CORINTO - MG
112 FAZENDA SÃO MIGUEL II - COROMANDEL - MG
113 FAZENDA SÃO MIGUEL - COROMANDEL - MG
114 FAZENDA HR - DOURADINHO - COROMANDEL - MG
115 JOAQUIM THEODORO DE MORAES - SERRA DO SALITRE - MG
116 FAZENDA MORRO DA CRUZ DAS ALMAS - PARACATU - MG
117 FAZENDA CRUZEIRO - DIAMANTINA - MG
118 FAZENDA CAETANO - PARACATU - MG
119 RESERVA FAZENDA BONITO DE CIMA I - COROMANDEL - MG
120 RESERVA FAZENDA BONITO DE CIMA VII - COROMANDEL - MG
121 RESERVA FAZENDA BONITO DE CIMA VI - COROMANDEL - MG
122 RESERVA FAZENDA BONITO DE CIMA V - COROMANDEL - MG
123 RESERVA FAZENDA BONITO DE CIMA IV - COROMANDEL - MG
124 RESERVA FAZENDA BONITO DE CIMA III - COROMANDEL - MG
125 RESERVA FAZENDA BONITO DE CIMA II - COROMANDEL - MG
126 RESERVA FAZENDA SÃO BERNARDO II - PATROCÍNIO - MG
127 RESERVA FAZENDA SÃO BERNARDO I - PATROCÍNIO - MG
128 RESERVA DA CACHOEIRA - SANTANA DO RIACHO - MG
129 MATA DA CRUZ - CONCEIÇÃO DO PARÁ - MG
130 RESERVA DO JACOB - FAZENDA LIMEIRA - NOVA PONTE - MG
131 RESERVA ECOLÓGICA FUNDAÇÃO ROCHA LOURDES - UNAÍ - MG
132 FAZENDA BOM JARDIM - MATOZINHOS - MG
133 FAZENDA DO LOBO - SÃO ROQUE DE MINAS - MG
134 CACHOEIRA DO CERRADÃO - SÃO ROQUE DE MINAS - MG
135 FAZENDA CACHOEIRA - SERRA DO SALITRE - MG
136 FAZENDA VEREDA GRANDE - PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG
137 FAZENDA CAETANO - SANTO AGOSTINHO - PARACATU - MG
138 FAZENDA CATIGUEIRO I - LAGOA DA PRATA - MG
139 FAZENDA CATIGUEIRO II - LAGOA DA PRATA - MG
140 APA DE PROTEÇÃO DO REIS DE JURAMENTO - JURAMENTO - MG
141 CABECIRA DAS FLORES - PAINEIRAS - MG
142 VILA AMANDA - PARAPEBA - MG
143 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO GALHEIROS - PERDIZES - MG
144 RESERVA ECOLÓGICA PANGA - UBERLÂNDIA - MG
145 FAZENDA DO SINO - BETIM - MG
146 FAZENDA CHACRINHA - CORAÇÃO DE JESUS - MG
147 ARARA VERMELHA - ARINOS - MG
148 FAZENDA GANA - TUPACIGUARA - MG
149 FAZENDA SAMOINHO - IGARATINGA - MG
150 FAZENDA SERROTE - IBIÁ - MG
151 SANTUÁRIO DO CARAÇA - SANTA BÁRBARA - MG
152 RECANTO DAS ÁGUAS CLARAS - PATROCÍNIO - MG
153 CABECEIRA DO MIMOSO - NOVA ANDRADINA - MS
154 DUAS PEDRAS - BANDEIRANTES - MS
155 FAZENDA DA BARRA - BONITO - MS
156 LAUDELINO FLORES DE BARCELLOS - TERENOS - MS

- 157 GAVIÃO DE PENACHO - CORGUINHO - MS
 158 NOVA QUERÊNCIA - TERENOS - MS
 159 VALE DO ANHANDUÍ - NOVA ANDRADINA - MS
 160 SÃO GERALDO - BONITO - MS
 161 XODÓ DO VÔ RUY - JARDIM - MS
 162 RESERVA SABIA - APARECIDA DO TABOADO - MS
 163 MORRO DA PEROBA - MARACAJU - MS
 164 PONTE DE PEDRA - COSTA RICA - MS
 165 RESERVA ECOLÓGICA VALE DO BUGIO - CORGUINHO - MS
 166 UFMS - CAMPO GRANDE - MS
 167 CABECEIRA DO PRATA - JARDIM - MS
 168 CACHOEIRA BRANCA - ÁGUA CLARA - MS
 169 FAZENDA TREVO - BONITO - MS
 170 FAZENDA BOQUEIRÃO - BONITO - MS
 171 FAZENDA AMÉRICA - BONITO - MS
 172 FAZENDA SINGAPURA - BONITO - MS
 173 ESTÂNCIA SANTA INÊS - CAMPO GRANDE - MS
 174 BURACO DAS ARARAS - JARDIM - MS
 175 B' LONGALÉ - SETE QUEDAS - MS
 176 OLHOS VERDES (MARGARIDA) - BELA VISTA - MS
 177 FAZENDA LAGEADO - DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS
 178 FAZENDA SÃO LUIZ - CUIABÁ - MT
 179 PARQUE ECOLÓGICO JOÃO BASSO - RONDONÓPOLIS - MT
 180 RESERVA ECOLÓGICA DA MATA FRIA - CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
 181 HOTEL MIRANTE - CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
 182 MOSQUITO - NARANDIBA - SP
 183 PARQUE DOS PÁSSAROS - BRAGANÇA PAULISTA - SP
 184 FAZENDA PALMIRA - ADAMANTINA - SP
 185 SÍTIO PALMITAL - ITÁPOLIS - SP
 186 FAZENDA CALIXTO - DIANÓPOLIS - TO
 187 CANGUÇU - PIUM - TO
 188 RESERVA BELA VISTA - PALMAS - TO
 189 FAZENDA MINNEHAHA - ALMAS - TO
 190 SÍTIO ECOLÓGICO MONTE SANTO - PALMAS - TO
 191 ÁGUA BONITA - ABREULÂNDIA - TO



Fonte: Departamento de Áreas Protegidas/SBF/MMA

Bibliografia

APA do Planalto Central. <http://www.icmbio.gov.br/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/cerrado/unidades-de-conservacao-cerrado/585-apa-do-planalto-central>

Biodiversidade do Cerrado e Pantanal: áreas e ações prioritárias para conservação / Ministério do Meio Ambiente. – Brasília: MMA, 2007. http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/cerrado_pantanal.pdf

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC. <http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=119>

Cerrado: Ecologia, Biodiversidade e Conservação. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005 <http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=72&idConteudo=1918>

Fotografias e Informações Básicas sobre Plantas do Cerrado. João de Deus Me-deiros. <http://www.flickr.com/photos/cerrados/>

Lista de Espécies da Flora do Brasil. Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro-IPJBRJ. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/>

Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. Instrução Normativa MMA No 06/08. <http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=24/09/2008&jornal=1&pagina=75&totalArquivos=104>

Mapa de Terras Indígenas do Brasil. http://mapas.funai.gov.br/dados/pdf/brasil_05_2011.pdf

O Fogo no Parque Nacional das Emas/França, H.; Ramos Neto, M. B.; Setzer, A. - MMA, 2007. http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/Livro%20Parque%20Nacional%20Emas.pdf

Plano de Ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas: Cerrado / Ministério do Meio Ambiente. – Brasília: MMA, 2011. http://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/ppcerrado_201.pdf

Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado – Programa Cerrado Sustentável. http://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/programa_cerrado_sustentavel_201.pdf

Série de Artigos sobre Plantas do Cerrado. Fernando C. P. Tatagiba <http://www.biologo.com.br/plantas/index.html>.

Índice

<i>Abolboda pulchella</i>	515	<i>Bauhinia unguolata</i>	212
<i>Achyrocline alata</i>	80	<i>Begonia grisea</i>	101
<i>Achyrocline satureioides</i>	81	<i>Bignonia corymbosa</i>	119
<i>Acianthera ochreatea</i>	419	<i>Bixa orellana</i>	127
<i>Acosmium dasycarpum</i>	205	<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	406
<i>Acrocomia aculeata</i>	67	<i>Bonamia agrostopolis</i>	171
<i>Actinocephalus polyanthus</i>	190	<i>Brosimum gaudichaudii</i>	393
<i>Adenocalymma nodosum</i>	102	<i>Buchnera juncea</i>	427
<i>Adenocalymma pedunculatum</i>	103	<i>Bulbophyllum rupicolum</i>	423
<i>Adenocalymma peregrinum</i>	104	<i>Bulbostylis paradoxa</i>	180
<i>Aechmea bromeliifolia</i>	129	<i>Butia archeri</i>	70
<i>Aegiphila lhotzkiana</i>	278	<i>Byrsonima basiloba</i>	307
<i>Aegiphila verticillata</i>	278	<i>Byrsonima coccolobifolia</i>	308
<i>Agarista virgata</i>	188	<i>Byrsonima guillemianiana</i>	309
<i>Alibertia concolor</i>	449	<i>Byrsonima intermedia</i>	310
<i>Alibertia edulis</i>	450	<i>Byrsonima laxiflora</i>	311
<i>Alibertia sessili</i>	451	<i>Byrsonima linearifolia</i>	312
<i>Allamanda angustifolia</i>	43	<i>Byrsonima pachyphylla</i>	313
<i>Alstroemeria plantaginea</i>	26	<i>Byrsonima verbascifolia</i>	314
<i>Alstroemeria stenopetala</i>	27	<i>Cabralea canjerana</i>	391
<i>Amasonia campestris</i>	279	<i>Calliandra dysantha</i>	213
<i>Amphilophium elongatum</i>	112	<i>Calliandra mucugeana</i>	214
<i>Anacardium humile</i>	30	<i>Calliandra viscidula</i>	215
<i>Anacardium occidentale</i>	31	<i>Callisthene major</i>	505
<i>Anadenanthera colubrina</i>	206	<i>Calolisianthus pedunculatus</i>	265
<i>Ananas ananassoides</i>	130	<i>Calolisianthus speciosus</i>	264
<i>Andira antheimia</i>	207	<i>Calophyllum brasiliense</i>	157
<i>Andira fraxinifolia</i>	208	<i>Camarea ericoides</i>	315
<i>Andira vermifuga</i>	209	<i>Cambessedesia espora</i>	340
<i>Anemopaegma arvense</i>	105	<i>Cambessedesia hilariana</i>	341
<i>Anemopaegma glaucum</i>	106	<i>Camptosema isopetalum</i>	216
<i>Annona crassiflora</i>	36	<i>Camptosema scarlatium</i>	217
<i>Annona monticola</i>	37	<i>Cardiopetalum calophyllum</i>	38
<i>Antonia ovata</i>	286	<i>Cariniana rubra</i>	285
<i>Aristolochia galeata</i>	79	<i>Caryocar brasiliense</i>	150
<i>Arrabidaea brachypoda</i>	107	<i>Cattleya elongata</i>	418
<i>Arrabidaea florida</i>	108	<i>Cavanillesia arborea</i>	319
<i>Arrabidaea pulchra</i>	109	<i>Cavanillesia umbellata</i>	319
<i>Aspidosperma macrocarpon</i>	44	<i>Cecropia hololeuca</i>	487
<i>Aspidosperma tomentosum</i>	45	<i>Cecropia pachystachya</i>	488
<i>Aspilia foliacea</i>	82	<i>Centrolobium tomentosum</i>	218
<i>Attalea brasiliensis</i>	68	<i>Centropogon cornutus</i>	146
<i>Attalea geraensis</i>	69	<i>Chaetostoma selagineum</i>	342
<i>Augusta longifolia</i>	452	<i>Chamaecrista cathartica</i>	219
<i>Baccharis dracunculifolia</i>	83	<i>Chamaecrista cathartica</i>	
<i>Banisteriopsis anisandra</i>	303	var. <i>paucijuga</i>	220
<i>Banisteriopsis campestris</i>	304	<i>Chamaecrista conferta</i>	221
<i>Banisteriopsis gardneriana</i>	305	<i>Chamaecrista desvauxii</i> var.	
<i>Banisteriopsis oxyclada</i>	306	graminea	222
<i>Barbacenia umbrosa</i>	489	<i>Chamaecrista flexuosa</i>	224
<i>Barjonia cymosa</i>	46	<i>Chamaecrista lundii</i>	223
<i>Bauhinia curvula</i>	210	<i>Chamaecrista racemosa</i>	
<i>Bauhinia rufa</i>	211	var. <i>lucida</i>	225

<i>Chamaecrista rotundata</i>	226	<i>Diodia teres</i>	453
<i>Chamaecrista ursina</i>	227	<i>Diospyros hispida</i>	187
<i>Chamaesyce caecorum</i>	195	<i>Diplusodon microphyllus</i>	298
<i>Cheiloclinium cognatum</i>	151	<i>Diplusodon sessiliflorus</i>	299
<i>Chelonanthus viridiflorus</i>	266	<i>Diplusodon villosissimus</i>	300
<i>Chelonanthus viridiflorus</i>	270	<i>Diplusodon virgatus</i>	301
<i>Chresta curumbensis</i>	84	<i>Discocactus placentiformis</i>	139
<i>Chresta sphaerocephala</i>	85	<i>Distictella elongata</i>	112
<i>Chrysophyllum marginatum</i>	478	<i>Drosera communis</i>	186
<i>Cipocereus minensis</i>	138	<i>Drosera montana</i>	185
<i>Cipura flava</i>	275	<i>Duguetia fufuracea</i>	39
<i>Cipura xanthomelas</i>	275	<i>Dyckia trichostachya</i>	131
<i>Cissus erosa</i>	504	<i>Dypterix alata</i>	232
<i>Cissus verticillata</i>	503	<i>Echinolaena inflexa</i>	440
<i>Clidemia hirta</i>	343	<i>Enciclia alboxanthina</i>	415
<i>Clidemia octona</i>	344	<i>Enterolobium gummiferum</i>	233
<i>Clistax brasiliensis</i>	16	<i>Epidendrum cristatum</i>	416
<i>Clitoria guianensis</i>	228	<i>Epidendrum secundum</i>	422
<i>Clusia burchellii</i>	158	<i>Epistephium lucidum</i>	420
<i>Clusia gardneri</i>	159	<i>Epistephium sclerophyllum</i>	426
<i>Clusia nemorosa</i>	160	<i>Eremanthus glomeratus</i>	86
<i>Clusia weddelliana</i>	161	<i>Eriosema defoliatum</i>	234
<i>Cnidoscopus phyllacanthus</i>	196	<i>Eriosema glaziovii</i>	235
<i>Cnidoscopus quercifolius</i>	196	<i>Eriosema stenophyllum</i>	236
<i>Cochlospermum regium</i>	128	<i>Eriotheca pubescens</i>	321
<i>Colubrina glandulosa</i>	448	<i>Erythroxilum citrifolium</i>	192
<i>Connarus suberosus</i>	169	<i>Erythroxyllum deciduum</i>	193
<i>Corchorus hirtus</i>	320	<i>Erythroxyllum suberosum</i>	194
<i>Cordia glabrata</i>	135	<i>Erytrina speciosa</i>	237
<i>Cordia superba</i>	136	<i>Erytrina verna</i>	238
<i>Cordia concolor</i>	449	<i>Esenbeckia grandiflora</i>	470
<i>Cordia sessilis</i>	451	<i>Esenbeckia pumila</i>	469
<i>Cuphea arenarioides</i>	293	<i>Esterhazyia macrodonta</i>	430
<i>Cuphea linarioides</i>	294	<i>Esterhazyia nanuzae</i>	429
<i>Cuphea micrantha</i>	295	<i>Eugenia bimarginata</i>	403
<i>Cuphea spermacoce</i>	296	<i>Eugenia calycina</i>	397
<i>Cuphea xanthopetala</i>	297	<i>Eugenia dysenterica</i>	398
<i>Curatella americana</i>	183	<i>Eugenia klotzschiana</i>	405
<i>Cuspidaria floribunda</i>	110	<i>Eugenia puniceifolia</i>	400
<i>Cuspidaria pulchra</i>	109	<i>Eulophia alta</i>	425
<i>Cybastax antisiphilitica</i>	111	<i>Euphorbia potentilloides</i>	195
<i>Cyrtopodium eugenii</i>	421	<i>Euphorbia sipolisii</i>	199
<i>Dalbergia miscolobium</i>	229	<i>Fridericia florida</i>	108
<i>Dalechampia caperonioides</i>	197	<i>Fridericia platyphylla</i>	107
<i>Dalechampia linearis</i>	198	<i>Galactia peduncularis</i>	239
<i>Davilla elliptica</i>	184	<i>Gaylussacia brasiliensis</i>	189
<i>Deianira erubescens</i>	267	<i>Genipa americana</i>	454
<i>Deianira nervosa</i>	268	<i>Geonoma brevispatha</i>	71
<i>Deianira pallescens</i>	269	<i>Gomphrena arborescens</i>	28
<i>Dendropanax cuneatus</i>	65	<i>Gomphrena officinalis</i>	28
<i>Desmodium villosa</i>	345	<i>Gomphrena scapigera</i>	29
<i>Desmodium discolor</i>	230	<i>Guapira graciliflora</i>	407
<i>Dichorisandra villosula</i>	167	<i>Guapira noxia</i>	408
<i>Dioclea grandiflora</i>	231	<i>Guarea guidonia</i>	392
<i>Diodella teres</i>	453	<i>Guazuma ulmifolia</i>	322

<i>Guettarda viburnoides</i>	455	<i>Licania humilis</i>	156
<i>Habenaria hamata</i>	424	<i>Lippia florida</i>	495
<i>Hancornia speciosa</i>	47	<i>Lippia lacunosa</i>	496
<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	122	<i>Lippia lupulina</i>	497
<i>Handroanthus impetiginosus</i>	123	<i>Lithrea molleoides</i>	32
<i>Handroanthus ochraceus</i>	124	<i>Loudetiopsis chrysothrix</i>	441
<i>Harpalyce brasiliana</i>	240	<i>Ludwigia tomentosa</i>	409
<i>Helicteres brevispira</i>	323	<i>Luehea divaricata</i>	25
<i>Helicteres sacarolha</i>	324	<i>Luehea paniculata</i>	326
<i>Himatanthus obovatus</i>	48	<i>Lupinus velutinus</i>	244
<i>Hirtella glandulosa</i>	154	<i>Lychnophora pinaster</i>	91
<i>Hirtella gracilipes</i>	155	<i>Lychnophora salicifolia</i>	92
<i>Hortia brasiliana</i>	471	<i>Lychnophora sellowii</i>	93
<i>Hortia oreadica</i>	471	<i>Lychnophora triflora</i>	94
<i>Humiria balsamifera</i>	273	<i>Lychnophora villosissima</i>	95
<i>Huperzia mooreana</i>	292	<i>Macairea radula</i>	349
<i>Hybanthus calceolaria</i>	502	<i>Macroditassa adnata</i>	49
<i>Hymenaea courbaril</i>	241	<i>Macroptilium atropurpureum</i>	245
<i>Hymenaea stigonocarpa</i>	242	<i>Macroptilium erythroloma</i>	246
<i>Hypenia macrantha</i>	280	<i>Macrosiphonia velame</i>	50
<i>Hyptis cruciformis</i>	281	<i>Magonia pubescens</i>	474
<i>Hyptis imbricatiformis</i>	282	<i>Mandevilla antennacea</i>	51
<i>Ichthyothere connata</i>	87	<i>Mandevilla hirsuta</i>	52
<i>Ichthyothere elliptica</i>	88	<i>Mandevilla illustris</i>	53
<i>Inga laurina</i>	243	<i>Mandevilla martiana</i>	54
<i>Ipomoea procumbens</i>	172	<i>Mandevilla myriophylla</i>	55
<i>Ipomoea squamisepala</i>	173	<i>Mandevilla tenuifolia</i>	56
<i>Irlbachia alata</i>	266	<i>Mandevilla velame</i>	50
<i>Irlbachia alata</i>	270	<i>Manihot fruticulosa</i>	200
<i>Irlbachia pedunculata</i>	265	<i>Manihot peltata</i>	201
<i>Irlbachia speciosa</i>	264	<i>Manihot quinqueloba</i>	202
<i>Jacaranda caroba</i>	113	<i>Manihot salicifolia</i>	203
<i>Jacaranda crystallana</i>	118	<i>Manihot violacea</i>	204
<i>Jacaranda cuspidifolia</i>	114	<i>Maranta leuconeura</i>	336
<i>Jacaranda grandifoliolata</i>	115	<i>Marcetia harleyi</i>	350
<i>Jacaranda irwinii</i>	116	<i>Marcetia taxifolia</i>	351
<i>Jacaranda macrantha</i>	117	<i>Marcetia velutina</i>	352
<i>Jacaranda ulei</i>	118	<i>Mauritia flexuosa</i>	72
<i>Jacquemontia linarioides</i>	175	<i>Mauritiella armata</i>	73
<i>Justicia lanstyakii</i>	17	<i>Mayaca fluviatilis</i>	339
<i>Justicia phyllocalyx</i>	18	<i>Merremia cissoides</i>	176
<i>Kielmeyera coriacea</i>	162	<i>Merremia flagellaris</i>	177
<i>Kielmeyera neriifolia</i>	163	<i>Merremia macrocalyx</i>	178
<i>Kielmeyera rubriflora</i>	164	<i>Merremia tomentosa</i>	174
<i>Kielmeyera speciosa</i>	165	<i>Merremia umbellata</i>	179
<i>Lagenocarpus rigidus</i>	181	<i>Miconia albicans</i>	354
<i>Lantana canescens</i>	493	<i>Miconia burchellii</i>	355
<i>Lantana trifolia</i>	494	<i>Miconia chamissois</i>	353
<i>Lavoisiera fragilis</i>	346	<i>Miconia ciliata</i>	356
<i>Lavoisiera grandiflora</i>	347	<i>Miconia cuspidata</i>	357
<i>Lavoisiera phyllocalycina</i>	348	<i>Miconia elegans</i>	358
<i>Lepidagathis floribunda</i>	19	<i>Miconia fallax</i>	359
<i>Lepidaploa aurea</i>	89	<i>Miconia ferruginata</i>	360
<i>Lepidaploa cotoneaster</i>	90	<i>Miconia macrothyrsa</i>	361
<i>Leptolobium dasy carpum</i>	205	<i>Miconia pepericarpa</i>	362

<i>Miconia rubiginosa</i>	363	<i>Pera glabrata</i>	436
<i>Miconia stenostachya</i>	364	<i>Perama hirsuta</i>	460
<i>Micranthocereus estevesii</i>	140	<i>Pereskia aculeata</i>	142
<i>Micranthocereus purpureus</i>	141	<i>Petrea volubilis</i>	498
<i>Microlicia euphorbioides</i>	365	<i>Phoradendron caripense</i>	473
<i>Microlicia fasciculata</i>	366	<i>Phryganocydia corymbosa</i>	119
<i>Microlicia fulva</i>	367	<i>Phthirusa ovata</i>	289
<i>Microlicia loricata</i>	368	<i>Physocalymma scaberrimum</i>	302
<i>Microlicia myrtoidea</i>	369	<i>Physocalyx major</i>	428
<i>Microlicia viminalis</i>	368	<i>Pilosocereus diersianus</i>	143
<i>Microlicia warmingiana</i>	370	<i>Pilosocereus pachycladus</i>	144
<i>Mikania argyrea</i>	96	<i>Pilosocereus vilaboensi</i>	145
<i>Mikania sessilifolia</i>	97	<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i>	401
<i>Mimosa caesalpiniiifolia</i>	247	<i>Piper aduncum</i>	437
<i>Mimosa claussenii</i>	248	<i>Piper tuberculatum</i>	438
<i>Mimosa hebecarpa</i>	249	<i>Piper umbellatum</i>	439
<i>Mimosa nuda</i>	250	<i>Piptadenia gonoacantha</i>	255
<i>Mimosa regina</i>	251	<i>Piptocarpha rotundifolia</i>	99
<i>Mimosa sensitiva</i>	252	<i>Plenckia populnea</i>	152
<i>Mouriri apiranga</i>	371	<i>Polystachia micrantha</i>	414
<i>Mouriri elliptica</i>	372	<i>Pouteria ramiflora</i>	479
<i>Mouriri pusa</i>	373	<i>Pouteria torta</i>	480
<i>Myracrodruon urundeuva</i>	33	<i>Prestonia coalita</i>	59
<i>Myrcia rostrata</i>	404	<i>Prestonia erecta</i>	60
<i>Myrcia splendens</i>	404	<i>Protium ovatum</i>	137
<i>Myrsine gardneriana</i>	395	<i>Pseudobombax longiflorum</i>	331
<i>Myrsine guianensis</i>	396	<i>Pseudobombax tomentosum</i>	332
<i>Nectandra cissiflora</i>	283	<i>Pseudobrickellia brasiliensis</i>	100
<i>Nectandra myriantha</i>	283	<i>Psidium cinereum</i>	399
<i>Norantea adamantium</i>	338	<i>Psidium grandifolium</i>	399
<i>Norantea guianensis</i>	337	<i>Psidium salutare</i> var. <i>pohlianum</i>	402
<i>Ocotea spixiana</i>	284	<i>Psittacanthus cinctus</i>	290
<i>Odontadenia lutea</i>	57	<i>Psittacanthus robustus</i>	291
<i>Orthophytum amoenum</i>	132	<i>Psychotria carthagenensis</i>	461
<i>Ouratea confertiflora</i>	412	<i>Psychotria colorata</i>	462
<i>Ouratea hexasperma</i>	413	<i>Psychotria florestana</i>	463
<i>Oxalis densifolia</i>	432	<i>Pterandra pyroidea</i>	316
<i>Oxalis hirsutissima</i>	431	<i>Pteridium aquilinum</i> var.	
<i>Oxypetalum erectum</i>	58	<i>arachnoideum</i>	182
<i>Paepalanthus giganteus</i>	191	<i>Pterodon pubescens</i>	256
<i>Palicourea coriacea</i>	456	<i>Pterolepis glomerata</i>	374
<i>Palicourea marcgravii</i>	457	<i>Pterolepis perpusilla</i>	375
<i>Palicourea officinalis</i>	459	<i>Pterolepis repanda</i>	376
<i>Palicourea rigida</i>	458	<i>Pyrostegia venusta</i>	120
<i>Palicourea squarrosa</i>	459	<i>Qualea dichotoma</i>	506
<i>Paralychnophora harleyi</i>	98	<i>Qualea grandiflora</i>	507
<i>Parkia platycephala</i>	253	<i>Qualea multiflora</i>	508
<i>Passiflora cerradense</i>	435	<i>Qualea parviflora</i>	509
<i>Passiflora edmundoi</i>	434	<i>Rhinchanthera grandiflora</i>	377
<i>Passiflora nitida</i>	433	<i>Rhodocalyx rotundifolius</i>	60
<i>Passovia ovata</i>	289	<i>Richardia grandiflora</i>	464
<i>Pavonia grandiflora</i>	327	<i>Roupala brasiliensis</i>	447
<i>Pavonia luetzelburgii</i>	328	<i>Roupala montana</i>	446
<i>Pavonia rosa-campestris</i>	329	<i>Rourea induta</i>	170
<i>Peltaea polymorpha</i>	330	<i>Ruellia affinis</i>	20
<i>Peltophorum dubium</i>	254	<i>Ruellia geminiflora</i>	21

<i>Ruellia incomta</i>	22	<i>Tabebuia aurea</i>	121
<i>Ruellia puri</i>	23	<i>Tabebuia heptaphylla</i>	122
<i>Ruellia simplex</i>	24	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	123
<i>Ruellia villosa</i>	25	<i>Tabebuia ochracea</i>	124
<i>Sabicea brasiliensis</i>	465	<i>Tabebuia roseoalba</i>	125
<i>Salacia crassifolia</i>	153	<i>Tabernaemontana hystrix</i>	63
<i>Salvertia convallariodora</i>	510	<i>Tachigali aurea</i>	257
<i>Sapindus saponaria</i>	475	<i>Tapirira guianensis</i>	35
<i>Sauvagesia erecta</i>	410	<i>Temnadenia violacea</i>	64
<i>Sauvagesia oliveirae</i>	411	<i>Terminalia fagifolia</i>	166
<i>Scheffera macrocarpa</i>	66	<i>Tetrapteris microphylla</i>	318
<i>Schinus terebinthifolius</i>	34	<i>Tibouchina aegopogon</i>	381
<i>Schubertia grandiflora</i>	61	<i>Tibouchina candolleana</i>	382
<i>Schultesia pachyphylla</i>	271	<i>Tibouchina heteromalla</i>	383
<i>Schwartzia adamantium</i>	338	<i>Tibouchina papyrus</i>	384
<i>Sclerolobium aureum</i>	257	<i>Tibouchina pereirae</i>	385
<i>Securidaca diversifolia</i>	443	<i>Tibouchina stenocarpa</i>	386
<i>Senna macranthera</i>	258	<i>Tillandsia streptocarpa</i>	133
<i>Senna pendula var. glabrata</i>	259	<i>Tococa guianensis</i>	387
<i>Senna rugosa</i>	260	<i>Tocoyena formosa</i>	467
<i>Serjania confertiflora</i>	476	<i>Trachypogon spicatus</i>	442
<i>Serjania velutina</i>	477	<i>Trema micrantha</i>	149
<i>Sida linifolia</i>	333	<i>Trembleya neopyrenaica</i>	388
<i>Simarouba versicolor</i>	482	<i>Trembleya parviflora</i>	389
<i>Sipanea hispida</i>	466	<i>Trembleya phlogiformis</i>	390
<i>Siparuna guianensis</i>	481	<i>Trimezia juncifolia</i>	276
<i>Siphanthera foliosa</i>	378	<i>Trimezia violacea</i>	277
<i>Siphocampylus imbricatus</i>	147	<i>Triplaris americana</i>	444
<i>Siphocampylus lycioides</i>	148	<i>Triplaris gardneriana</i>	445
<i>Solanum lycocarpum</i>	483	<i>Tripogandra diuretica</i>	168
<i>Solanum palinacanthum</i>	484	<i>Turnera longiflora</i>	486
<i>Spigelia pulchella</i>	287	<i>Vellozia caruncularis</i>	490
<i>Spigelia spartioides</i>	288	<i>Vellozia hemispherica</i>	491
<i>Spiranthera odoratissima</i>	472	<i>Vellozia squamata</i>	492
<i>Stachytarpheta glauca</i>	499	<i>Vellozia flavicans</i>	492
<i>Stachytarpheta longispicata</i>	500	<i>Virola sebifera</i>	394
<i>Stachytarpheta radlkoferiana</i>	501	<i>Vismia decipiens</i>	274
<i>Stenodon gracilis</i>	379	<i>Vismia pentagyna</i>	274
<i>Stenodon suberosus</i>	380	<i>Vochysia elliptica</i>	511
<i>Sterculia striata</i>	334	<i>Vochysia thyrsoidea</i>	512
<i>Stigmaphyllon paralias</i>	317	<i>Vochysia tucanorum</i>	513
<i>Stipecoma peltigera</i>	62	<i>Voyria aphylla</i>	272
<i>Stryphnodendrom adstringens</i>	261	<i>Vriesea atra</i>	134
<i>Stylosanthes scabra</i>	262	<i>Waltheria americana</i>	335
<i>Stylosanthes viscosa</i>	263	<i>Xylopia aromatica</i>	40
<i>Styrax ferrugineus</i>	485	<i>Xylopia emarginata</i>	41
<i>Syagrus comosa</i>	74	<i>Xylopia sericea</i>	42
<i>Syagrus flexuosa</i>	75	<i>Xyris jupicai</i>	514
<i>Syagrus glaucescens</i>	76	<i>Zanthoxylon rhoifolium</i>	468
<i>Syagrus petraea</i>	77	<i>Zeyheria montana</i>	126
<i>Syagrus romanzoffiana</i>	78	<i>Zygopetalum sincoranum</i>	417



Departamento de Florestas

Secretaria de
Biodiversidade e Florestas

Ministério
do Meio Ambiente

