
GEL DE *Calendula officinalis* L.

SINONÍMIA

Não consta.

NOMENCLATURA POPULAR

Calêndula.

FÓRMULA

<i>Componentes</i>	<i>Quantidade</i>
extrato glicólico de calêndula	10 mL
gel base q.s.p.	100 g

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Pesar o gel base, adicionar o extrato glicólico e misturar até homogeneização completa.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Acondicionar em pote plástico não transparente. Armazenar em local fresco, seco e ao abrigo da luz.

ADVERTÊNCIAS

Manter fora do alcance de crianças.

INDICAÇÕES

Antisséptico, anti-inflamatório e cicatrizante. Auxiliar no tratamento da acne e inflamações em geral (CASLEY-SMITH, 1983; FLEISCHNER, 1985).

MODO DE USAR

Uso externo.

Após higienização, aplicar na área afetada até três vezes ao dia.

REFERÊNCIAS

CASLEY-SMITH, J. R., CASLEY-SMITH, J. R. The effect of “Unguentum lymphaticum” on acute experimental lymphedema and other high-protein edemas. **Lymphology**, 16, 150-6, 1983.

FLEISCHNER, A. M. Plant extracts: to accelerate healing and reduce inflammation. *Cosmet. Toilet.*, 100, 45, 1985.
